



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

11/10-3-17

ΑΧΛΑΔΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις : Οι αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές μολύνσεις. Χρόνος επώασης ένα δεκαπενθήμερο.

Οδηγίες: **Επέμβαση στις αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.**

Φυτ/κά προϊόντα: **1. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανκοζέμπ (όχι σε κρυστάλλι και Κόσια), Μετιράμ (όχι σε Κόσια), Ντιθιανόν (έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν (έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση), χαλκούχο σκεύασμα ως το στάδιο Γ3-Δ.

2. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Bacillus subtilis –strain QST 713, Θειοφανείτ-μεθύλ {1 επέμβαση ανά καλ. περίοδο}, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυριμεθανίλ, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Potassium phosphonates (όχι σε Κρυστάλλι και Κοντούλα), Ντιφenoκοναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ, Πυριμεθανίλ Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Συπροντινίλ +Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν+ Κάπταν, Φενμπουκοναζόλ, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ.

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο και πέρσι υπήρχαν προσβολές.

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ** συνεχείς επισκέψεις στα δένδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

Φυτ/κά προϊόντα: **ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ**

Μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Στο στάδιο (Γ3-Δ) προληπτική επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή Λαμιναρίν (ενισχύει την αντίσταση του φυτού στο βακτηριακό κάψιμο) ή Φοσετύλ –Αλ . ▶

2. Στην έναρξη της ανθοφορίας (10% άνθηση) προληπτικά με *Aureobasidium pulluans* DSM 14940.

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτής της επέμβασης θα πρέπει να μειωθεί το ΡΗ του ψεκαστικού διαλύματος, ενώ η θερμοκρασία του να είναι μικρότερη από 30° C.

Αν υπάρξει εμφάνιση προσβολής να γίνει επέμβαση με *Bacillus subtilis* –strain QST 713.

3. ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ

Τα ακμαία θηλυκά ωτοκοούν επάνω στα άνθη της αχλαδιάς (στη βάση του κάλυκα). Οι νεαρές προνύμφες, που εκκολάπτονται σε λίγες μέρες, διεισδύουν στο εσωτερικό των μικρών καρπών απ' όπου και τρέφονται.

Συμπτώματα: Οι προσβεβλημένοι νεαροί καρποί παρουσιάζουν παραμορφώσεις, σκοτεινές κηλίδες και τελικά πέφτουν.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών, να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/κά *Δελταμεθρίν.*

προϊόντα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών(και διαφορετικός τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραμμα επεμβάσεων, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
- Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Υπάρχουν δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση οι οποίες καλό είναι να χρησιμοποιούνται προληπτικά πχ **Θειοφανείτ μεθύλ κ.α**
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ