

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος
Τηλ: 2421066525 - Fax: 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες : Φωτοπούλου Αννέτα

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Ν° 5 - 6 /11/2014

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ (*Anthonomus amygdali*)



Ο ανθονόμος της αμυγδαλιάς έχει μήκος 3-4mm και χρώμα σκούρο καστανό. Έχει μία γενεά το έτος είναι δραστήριο το χειμώνα και την άνοιξη. Το καλοκαίρι τα ενήλικα άτομα βρίσκονται σε προστατευμένες θέσεις πάνω ή κοντά στα δένδρα (κάτω από ξερούς φλοιούς, σε ρωγμές του φλοιού, μέσα στο έδαφος και αλλού).

Τα ενήλικα δραστηριοποιούνται από τις αρχές Νοεμβρίου και αφού τραφούν για δυο εβδομάδες σε βάρος των οφθαλμών, αρχίζουν να ωστοκοούν από τον Δεκέμβριο έως τέλος Φεβρουαρίου, αναλόγως της περιοχής. Το θηλυκό εναποθέτει σε κάθε οφθαλμό ένα αυγό και οι προσβεβλημένοι οφθαλμοί ξηραίνονται και πέφτουν χωρίς να ανοίξουν.

Συστάσεις: Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι το φθινόπωρο ο ενήλικος πληθυσμός του εντόμου πάνω στα δένδρα είναι πυκνός, συνίσταται ένας ψεκασμός τον Νοέμβριο πριν πέσουν τα φύλλα και επανάληψη μετά την πτώση (των 3/4 των φύλλων) μέχρι και τον Ιανουάριο μήνα, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilinia laxa*)

Είναι η σοβαρότερη ασθένεια της αμυγδαλιάς. Κατά τη φετινή χρονιά υπήρξε έντονη προσβολή από την ασθένεια στο νομό Μαγνησίας (στις περιοχές Νέα Αγχιάλο και Κανάλια), καθώς και σε ορισμένες περιοχές των νομών Λάρισας και Φθιώτιδας, όπου καλλιεργείται η αμυγδαλιά.

Συστάσεις: 1) Κλάδευμα και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων, και καρπών (μούμιες) των δένδρων. 2) ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό με την πτώση των 3/4 των φύλλων και επανάληψη κατά την περίοδο της χειμερίας νάρκης.

ΚΟΡΥΝΕΟ (*Coryneum beijerinckii*)

Η προσβολή από το κορύνεο ευνοείται από τις πολλές βροχές του φθινοπώρου και του χειμώνα, όποτε συνεχίζονται οι προσβολές των νεαρών βλαστών ιδιαίτερα (προκαλεί έλκη στους βλαστούς και κλάδους).

Συστάσεις: 1) Να γίνουν ψεκασμοί με βορδιγάλειο πολτό με την πτώση των 3/4 των φύλλων και επανάληψη με τα ίδια φάρμακα κατά την περίοδο της χειμερίας νάρκης (λίγο πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών).

2. Συλλογή και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων της αμυγδαλιάς το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.

Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται ταυτόχρονα με την μονιλία.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (*Polystigma ochraceum*)



Κατά τη φετινή χρονιά υπήρξε έντονη προσβολή από την ασθένεια σε αμυγδαλεώνες του νομού Μαγνησίας (περιοχές Νέα Αγγιάλο και Κανάλια), καθώς και σε ορισμένες περιοχές των νομών Λάρισας και Φθιώτιδας.

Συστάσεις: 1) Ψεκάσμο των δένδρων με βορδιγάλειο πολτό πριν την πτώση των φύλλων. 2) Για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των μολυσμάτων, συνιστάται επίσης ψεκάσμος των πεσμένων στο έδαφος μολυσμένων φύλλων με ουρία 10-12% και ενσωμάτωση αυτών (πολύ βαθύ παράχωμα) κατά τον χειμώνα με καλλιέργεια του εδάφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να τηρούνται αυστηρά :

- 1) Οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
- 2) Το τελευταίο επιτρεπόμενο χρονικό όριο ψεκάσμου πριν τη συγκομιδή, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα κάθε σκευάσματος.
- 3) Η συνδυαστικότητα.

Όλα τα Δελτία μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«www.minagric.gr»

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Δημ. Λύκας