

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr






Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν°7

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

(Ευδεμίδα - Περονόσπορος - Ωίδιο - Τζιτζικάκι - Θρίπες - Πλανόκοκκος)

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|--|---|---|
| Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας την περίοδο αυτή | Κλίμακα Baggioiini |  |  |  |  |  |
| | | Στάδιο G Εσχώρισμα σταφυλιών | Στάδιο H Μούρο | Στάδιο H - I Μούρο -Εναρξη άνθησης | Στάδιο I Άνθηση | Στάδιο J Καρπόδεση |
| Πρώιμη ζώνη | | | | Από I έως J, κυρίαρχο το J | | |
| Μεσοπρώιμη | | | | Από H έως J, κυρίαρχο το I | | |
| Όψιμη ζώνη | | Από G έως I, κυρίαρχο το H | | | | |

Πιν. 2. Μετεωρολογικά και επιδημιολογικά στοιχεία το τριήμερο 17-19 Μαΐου

| Ημ/νια | Βροχή (σε χιλ) & Ωροβαθμοί μόλυνσης* | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΡΧΑΝΕΣ | ΒΟΝΗ | ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΣΗΜΙ | ΣΗΤΕΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 17-18 Μαΐου | Βροχή | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | 11 |
| | Ωροβαθμοί * | 235 | 220 | 170 | 186 | 152 | 187 | 233 | 277 | 237 |
| 18-19 Μαΐου | Βροχή | 6 | 7 | 9 | 24 | 18 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| | Ωροβαθμοί* | 174 | 265 | 210 | 330 | 297 | 266 | 183 | 228 | 195 |

* Οι ωροβαθμοί μόλυνσης είναι το άθροισμα των ωριαίων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της συνεχόμενης διύγρυνσης της βλάστησης. Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο του περονόσπορου η διαβάθμιση της επικινδυνότητας για μόλυνση είναι:
0 - 50 → καμία μόλυνση, 50 - 100 → χαμηλή μόλυνση, 100 - 200 → μέτρια μόλυνση, > 200 → **σοβαρή μόλυνση**.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στην **πρώιμη - παραλιακή ζώνη** καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα της ευδεμίδας τις τελευταίες μέρες (αυξανόμενοι πληθυσμοί - αραιές ωστοκίες).

Οδηγίες :

Στις περιοχές αυτές συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμες - παραλιακές περιοχές :

- **Επιτραπέζια : 23 - 24 Μαΐου.**
- **Σουλτανίνα - οινάμπελα : 26 - 27 Μαΐου.**

Επειδή από αμπέλι σε αμπέλι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την επιδεκτικότητα των ρωγών, σε σουλτανίνες που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο τέλος άνθησης - έναρξη καρπόδεσης η καταπολέμηση μπορεί να γίνει 1-2 μέρες μετά.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις υπόλοιπες περιοχές (ενδιάμεσες - κάτω Μεσοαρά - μεσοπρώιμες - όψιμες) καθώς και για το νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι βροχές (έντονες κατά τόπους) που σημειώθηκαν από το απόγευμα της 17^{ης} έως το μεσημέρι της 19^{ης} Μαΐου δημιούργησαν συνθήκες για σοβαρές μολύνσεις (Πιν. 2).

- Η περίοδος επώασης του μύκητα και εμφάνισης των συμπτωμάτων την περίοδο αυτή είναι σύντομη (5 - 7 ημέρες από τη μόλυνση).

- Τα βλαστικά στάδια που βρίσκονται πολλά αμπέλια (μούρο - άνθηση - καρπόδεση) είναι ευαίσθητα στην ασθένεια (προσοχή γιατί ο περονόσπορος μπορεί να χτυπήσει κατευθείαν στις ταξιανθίες).

Οδηγίες :

- Σε αμπέλια - τοποθεσίες που ήδη υπάρχει η ασθένεια να συνεχιστεί η συστηματική αντιμετώπιση.

- Σε αμπέλια - τοποθεσίες - περιοχές που εμφανίζονται συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) να γίνει αμέσως καταπολέμηση.

- Να χρησιμοποιούνται διασυστηματικά ή διεισδυτικά σκευάσματα.

- Τα αμπέλια με συμπτώματα, επόμενες βροχές ή περίοδοι με έντονες δροσιές, πρέπει να τα βρίσκουν καλυμμένα.

- Η ταχύτατη αύξηση του μήκους της βλάστησης (22 - 48 εκ. την τελευταία εβδομάδα από τακτικές παρατηρήσεις στην ποικιλία σουλτανίνα) να λαμβάνεται υπόψη στα μεσοδιαστήματα εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Συνεχής η δραστηριότητα του μύκητα ιδίως αυτή την περίοδο που τα στάδια είναι ευαίσθητα.

Οδηγίες :

Απαραίτητη η αντιμετώπισή του. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένης επέμβασης με τον περονόσπορο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

| | |
|--|---|
| <p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p>  | <p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σε ένα γενικό κανόνα, οι πληθυσμοί του εντόμου (τέλεια πτερωτά άτομα) που καταγράφονται στα αμπέλια, εμφανίζονται ακόμα χαμηλοί. <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δεν συνιστάται ακόμα ψεκασμός. Η καταπολέμηση στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ</p> |
| <p>ΘΡΙΠΕΣ: (<i>Thripidae</i>)</p>  | <p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος της άνθησης – καρπόδεσης είναι κρίσιμη για τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να συνεχιστεί ο έλεγχος με τσίγαμα ταξιανθιών σε λευκό χαρτί και να γίνεται καταπολέμηση όπου διαπιστώνονται υψηλοί πληθυσμοί. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους θρίπες πατήστε εδώ</p> |
| <p>ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus ficus</i>)</p>  | <p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (κόλλα και εμφάνιση καπνιάς κοντά στη συγκομιδή). <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του ψευδόκοκκου. - Σε επιτραπέζια σταφύλια που υπάρχει ιστορικό προσβολών και μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται επιμελημένος ψεκασμός. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ</p> |

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 22 Μαΐου 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη