



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

13/21-3-16

### ΜΗΛΙΑ

#### 1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

#### ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Γ

BBCH SCALE 9



Γ<sub>3</sub>

10



Δ

53



Δ<sub>3</sub>

54



Ε

55



Ε<sub>2</sub>

59

#### Διαπιστώσεις:

Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης, αρχίζουν με την εμφάνισή της (**βλαστικό στάδιο Γ-Γ<sub>3</sub> – πράσινη κορυφή**) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. **Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.**

#### Οδηγίες:

#### Φυτ/κά

#### προϊόντα:

**Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες στο στάδιο της πράσινης κορυφής.**

**A. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Λαμιναρίν, Μανκοζέμπ (όχι σε Golden), Μετιράμ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση, Προπινέμπ.

**B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:**

*Bacillus subtilis* strain QST 713, Θειοφανείτ-μεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστρομπίν, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Ντιφenoκοναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριμεθανίλ, Ντιθιανόν+Πυριμεθανίλ Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Συπροντινίλ, Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ+ Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, Χαλκός.

**-Στην πράσινη κορυφή να χρησιμοποιηθεί χαλκούχο σκεύασμα ή ΦΠ με προστατευτική δράση.**



- Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών(και διαφορετικός τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραμμα επεμβάσεων.
- Υπάρχουν δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση οι οποίες καλό είναι να χρησιμοποιούνται προληπτικά πχ *Θειοφανείτ μεθύλ κ.α*

## **2.ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ**

Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η pronύμφη τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν **σοβαρές προσβολές**, να γίνει ψεκασμός όταν τα δένδρα φτάσουν στα βλαστικά στάδια Γ3 έως Ε2.

**Φυτ/κά προϊόντα:**

*Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωρπυριφός.*

## **3.ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές (κυρίως σε παλιές φυτείες) να γίνει ψεκασμός. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

**Φυτ/κά προϊόντα:**

*Θερινά λάδια, Κλοθιανιντίν, Σπιροτετραμάτ, χλωρπυριφός.*

## **4. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει άμεσα επέμβαση με Κλοφεντεζίν + θερινά λάδια.

**Φυτ/κά προϊόντα:**

β) στα βλαστικά στάδια Ε-Ε2 με *Εξιθιαζόξ*, αν δεν έχει προηγηθεί η επέμβαση με *Κλοφεντεζίν*.

γ) στην πλήρη πτώση των πετάλων με: *Αμπαμεκτίν, Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν* εφόσον δεν έχει προηγηθεί καμία επέμβαση από τις προηγούμενες.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- 1.Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**