



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου, Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

14/ 23-4-18

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η πρώτη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές με υψηλές συλλήψεις.

**Οδηγίες
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Μέχρι στις 25 Απρίλη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Βάκιλλος Θουριγγίας* (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), *Ακριναθρίν+ Αμπαμεκτίν*, *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ*, *Μεθοξυφenoζάντ*, *Ντιφλουμπενζουρόν*, *Τεμπουφenoζάντ*.

2.Από 26 ως 29 Απρίλη:

Δελταμεθρίν, *Εμαμεκτίν μπενζοείτ*, *Θιακλοπρίντ*, *Ιντοξακάρμπ*, *Λάμντα Συαλοθρίν*, *Μπέτα συφλουθρίν*, *Σπινοσάντ*, *Σπινετοράμ*, *T-Φλουβαλινείτ*, *Φοσμέτ*, *Χλωλπυριφός μεθύλ*.

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1.Μέχρι στις 25 Απρίλη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Βάκιλλος Θουριγγίας*.

2. Από 26 ως 29 Απρίλη:

Δελταμεθρίν, *Εμαμεκτίν μπενζοείτ*, *Σπινετοράμ*, *T-Φλουβαλινείτ*, *Φοσμέτ*, *Χλωλπυριφός μεθύλ*, *Χλωλπυριφός*.

Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει επέμβαση για την καρπόκαψα. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά με δραστικές ουσίες που επιτρέπεται ο συνδυασμός, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης. ►

**ΦΥΤ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Rapeseed oil, Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν (δρά και σε ηλικιωμένες νύμφες N5), Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (δρά σε αυγά και νύμφες), Ιμιντακλοπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύμφες), Σπινοςάντ, Σπιροτετραμάτ (δρα σε νύμφες), Σπινετοράμ (δρα σε νύμφες) , T-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρά σε αυγά και νύμφες), Χλωλπυριφός μεθύλ.

**3. ΣΕΖΙΑ
Οδηγίες:**

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**ΦΥΤ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Μπέτα συφλουθρίν

4. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Σε οπωρώνες που δεν υπάρχουν προσβολές να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προστατευτική δράση.

**ΦΥΤ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

5. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες:

Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να λαμβάνονται τα αναφερόμενα σε προηγούμενο δελτίο καλλιεργητικά μέτρα.

6. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ

Οδηγίες:

Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

7. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες:

Στις καρυδιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Μέχρι στις 25 Απρίλη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας.

2. Από 26 ως 29 Απρίλη:

Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ