

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Φουζικλάδιο. Έντονες προσβολές της φετινής περιόδου.



Βακτηριακό κάψιμο. Έλκος σε κλαδίσκο όπου διαχειμάζει το βακτήριο.



Σέξια. Προνύμφη και αποχωρήματα κάτω από το φλοιό βραχίονα μηλιάς.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Εράγγελος Α. Αλατσατιανός

7.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :
(*Fusicladium dendriticum*)
(*Fusicladium pyrinum*)
(Μηλιά - Αχλαδιά)

Οδηγίες:

Η ασθένεια ευνοήθηκε τη φετινή περίοδο κι έδωσε προσβολές σε αχλαδιές αλλά και σε μηλιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου οι ζημιές ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Ο μύκητας διαχειμάζει στα πεσμένα φύλλα στις μηλιές, ενώ στις αχλαδιές κυρίως σε προσβεβλημένους βλαστούς.

Ο περιορισμός των αρχικών μολυσμάτων της επόμενης άνοιξης, την εποχή αυτή βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικά μέτρα:

- Στις μηλιές και στις περιοχές που εκδηλώθηκαν σοβαρές προσβολές συστήνεται αμέσως μετά τη φυλλόπτωση να γίνει ψεκασμός των πεσμένων φύλλων με διάλυμα ουρίας 5% ή παράχωμά τους στο έδαφος.

Το παραπάνω μέτρο είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται σε όλες τις μηλιές στην ίδια περιοχή.

- Στις αχλαδιές συστήνεται στο χειμερινό κλάδεμα οι προσβεβλημένοι βλαστοί της περασμένης περιόδου να αφαιρούνται και να καταστρέφονται.

<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>)</p> <p>(Αχλαδιά)</p>	<p>Δεν ευνοήθηκε αυτή την χρονιά η ασθένεια με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθούν έντονες και γενικευμένες προσβολές στις αχλαδιές. Την περίοδο που ακολουθεί για την μείωση των μολυσμάτων συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά τη φυλλόπτωση να γίνει ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα στη μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση. • Κατά το κλάδεμα να αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ξύλου μήκους τουλάχιστον 20 εκ. και να καίγονται. Οι εργασίες κλαδέματος να γίνονται με ξηρό καιρό, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με οινόπνευμα του εμπορίου και οι μεγάλες τομές να επαλείφονται με απολυμαντικό πληγών ή βορδιγάλεια πάστα. • Αμέσως μετά το κλάδεμα επανάληψη ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα.
<p>Σ Ε Ζ Ι Α : (<i>Sesia myopiformis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Σοβαρό ξυλοφάγο έντομο του κορμού και των κύριων βραχιόνων της μηλιάς που γεννά κυρίως σε πληγές ή σχισμές. Ανασηκώνοντας το φλοιό την εποχή αυτή, στο σημείο της πληγής - σχισμής παρατηρούνται καφέ αποχωρήματα και προνύμφες χρώματος κρεμ ζαχαρι με καστανό κεφάλι διαφόρων μεγεθών έως και 2,5 εκ..</p> <p>Για τη μείωση του πληθυσμού την εποχή αυτή συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επάλειψη του κορμού και των χοντρών βραχιόνων με μίγμα θερινού ορυκτέλαιου και εγκεκριμένου εντομοκτόνου. • Αργότερα, κατά το κλάδεμα, να γίνεται αφαίρεση και απομάκρυνση των ξηρών και εξασθενημένων κλάδων.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ηράκλειο 18 Νοεμβρίου 2015
 Η Προϊσταμένη Τμήματος
 Κληρονόμου Ευφροσύνη