

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο


Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον



ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ευδεμίδα. Αυγό σε ράγα.



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Περνόςπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.



Περνόςπορος. Οι «λαδιές» με υγρασία δίνουν λευκές χιονώδεις εξανθήσεις μόνο στην κάτω επιφάνεια του φύλλου.



Ωίδιο. Κηλίδες όπως φαίνονται στην πάνω επιφάνεια. Είναι πιο ανοιχτού χρώματος και λιγότερο έντονες από τον περονόσπορο.



Ωίδιο. Αλευρώδες επίχρισμα (σπόρια) σε φύλλα - βλαστό και κατσάρωμα του φύλλου.



Ωίδιο. Προσβολή σε σταφύλια πριν από την άνθηση με εμφάνιση σπορίων.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου και διαπιστώνονται οι πρώτες αραιές ωτοκίες.</p> <p>Συνιστάται αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές περιοχές και ημερομηνίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πρώιμες περιοχές (Γούβες, Γάζι, Σητεία, Πισκοκέφαλο, Μάλια, Χερσόνησος, , περιοχή Τριπλακίου, κλπ) Επιτραπέζια: 2 - 3 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 5 - 7 Ιουνίου. - Ενδιάμεση ζώνη & Κάτω Μεσσαρά (βρίσκεται μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης όπως Καλέσα, Βούτες, Βασιλείς, Σόλλαμος, Βάθεια, Καταριανά, Μοίρες, κλπ) Επιτραπέζια: 5 - 7 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 8 - 10 Ιουνίου. <p>Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν <u>ωοκτόνα σκευάσματα</u> η επέμβαση να γίνει άμεσα με τη λήψη του δελτίου.</p> <p>Σημείωση. Η οδηγία αφορά μόνο τα αμπέλια που βρίσκονται στην πρώιμη και ενδιάμεση ζώνη των νομών Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Για τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές καθώς και για το νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας. - Τα στάδια της άνθησης, της καρπόδεσης και το χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων μετά το δέσιμο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις προσβολές του παθογόνου και πρέπει να προστατεύονται. - Στην άνθηση να προτιμάται το θειάφι σε σκόνη.
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τις 25 Μαΐου δεν ενόησαν της εξάπλωση της ασθένειας στην πρώιμη και την μεσοπρώιμη ζώνη. Για την ώρα περιορίζεται σε τοπικές εστίες κοντά στις αρχικές θέσεις εμφάνισης. - Στις περιοχές της ορεινής - όψιμης ζώνης που σημειώθηκαν βροχές στις 12 Μαΐου ύψους έως 54 χιλ. έχουν εκδηλωθεί νέες εστίες. - Οι κατά τόπους σημαντικές βροχές ύψους 10 - 14 χιλ. στις 28 - 29 Μαΐου, θα δώσουν νέες μολύνσεις σε τοποθεσίες που έχει εκδηλωθεί η ασθένεια. <p>Οδηγίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Στις τοποθεσίες που έχουν εμφανιστεί συμπτώματα να γίνει άμεσα καταπολέμηση.</u> - <u>Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί.</u> Λόγω της ευαισθησίας των βλαστικών σταδίων του αμπελιού και της καιρικής αστάθειας να συνεχιστεί ο συστηματικός έλεγχος. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να γίνεται άμεσα καταπολέμηση.
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμα σημαντικοί πληθυσμοί στις αμπελουργικές περιοχές της βόρειας Κρήτης σε αντίθεση με αρκετές περιοχές της Μεσσαράς.</p> <p>Να συνεχιστεί ο έλεγχος στην ακραία βλάστηση και όπου εμφανίζεται να γίνεται άμεσα επέμβαση.</p>
<p>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus ficus</i>)</p>	<p><u>Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές, σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση που εντοπίζονται πληθυσμοί ή υπάρχει ιστορικό προσβολών και δεν έχει γίνει ακόμα καμία αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</u> Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.</p>

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Οι επεμβάσεις να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες στο αμπέλι εναντίον της ευδεμίδας

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Στάδιο του εντόμου που δρα το εντομοκτόνο Α=αυγά Πρ=Προνύμφη	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
1B	Chlorpyrifos	Πρ	Κατά την εκκόλαψη των αυγών	1	30
	Chlorpyrifos-methyl	Πρ		2	21
	Alpha-cypermethrin	Πρ		2	7 ή 14
	Beta-cyfluthrin	Πρ		2	14
	Cypermethrin	Πρ		1	21
	Cypermethrin	Πρ		2	7
	Deltamethrin	Πρ		3	7
	Esfenvalerate	Πρ		2	14
	Etofenprox	Πρ		3	14
	Lambda cyhalothrin	Πρ		2	9
	Lambda cyhalothrin	Πρ		2	7
	Pyrethrins	Πρ		3	2
22A	Indoxacarb	Πρ		3	10
5	Spinosad	Πρ		4	14
6	Emamectin benzoate	Πρ		3	7
	Abamectin	Πρ	2	28	
7B	Fenoxycarb	A, Πρ	Κατά την εναπόθεση των αυγών	2	20
18	Methoxyfenozide	A, Πρ		4	14 οινοποιησιμα 7 επιτραπέζια
	Tebufenozide	(A), Πρ		2	21
28	Chlorantraniliprole	A, Πρ		1 οινοπ. 2 επιτρ.	30 οινοποιησιμα 3 επιτραπέζια
	Chlorantraniliprole + Thiamethoxam	A, Πρ	1	30 οινοποιησιμα 14 επιτραπέζια	
11A	Bacillus thuringiensis (Βάκιλλος με επίπαση ή ψεκασμό κάλυψης)	Πρ	Με την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών	3 ή 4	0
	Δραστική παρεμπόδισης σύζευξης	Εναντίον αρσενικών	Με τις πρώτες συλλήψεις αρσενικών		-

Η ομαδοποίηση των δραστικών είναι σύμφωνη με τον διεθνή οργανισμό I.R.A.C.

Συνιστάται για την διαχείριση της ανθεκτικότητας η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική ομάδα δράσης.

*Ηράκλειο 30 Μαΐου 2015
Η Προϊστάμενη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη*