



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238
Email: pkrfpatr@otenet.gr

Πληροφορίες: Ν. Πέττας, Γεωπόνος

ΔΕΛΤΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΜΠΕΛΙ: Ν° 6 / 20-06-2014

Βλαστικά Στάδια Αμπελιού



Φαινολογικά
στάδια:

Πρώιμες περιοχές – πρώιμες ποικιλίες: Στάδιο Μ : Πριν το κλείσιμο.
Όψιμες περιοχές - όψιμες ποικιλίες: Στάδιο Κ: Δέσιμο ραγών.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

Διαπιστώσεις /
Συστάσεις:

Καταστροφικά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχές, ισχυρούς ανέμους και χαλαζόπτωση παρουσιάστηκαν στην Ηλεία και την Αχαΐα στον τέλος Μαΐου και το 1^ο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεδομένου ότι ο καιρός της άνοιξης ήταν ιδανικός για την ανάπτυξη του περονοσπόρου, επιδημίες με εκτεταμένες προσβολές και τοπικά ολοκληρωτική καταστροφή διαπιστώθηκαν σε όλες τις περιοχές. Επειδή ο καιρός παραμένει πολύ ευνοϊκός να συνεχιστεί η προστασία.

ΟΪΔΙΟ:

Διαπιστώσεις /
Συστάσεις:

Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Προσβολές έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιοχές. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας. Να συνεχιστεί η προστασία των βοτρώων με σχολαστικούς ψεκασμούς.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ:

Διαπιστώσεις /
Συστάσεις:

Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται συνήθως ζημιές από την ασθένεια (βαριά εδάφη, ποτιστικά αμπέλια, ευαίσθητες ποικιλίες), να γίνει πριν το κλείσιμο του σταφυλιού και στην αρχή του γυαλισματος προληπτική προστασία για τον Βοτρύτη. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του Βοτρύτη είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου, αλλά και του περονοσπόρου.

Καλλιεργητικά μέτρα, όπως τα θερινά κλαδέματα, που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας των ασθενειών.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:

Διαπιστώσεις:
Συστάσεις:

Συνεχίζεται, με μικρούς πληθυσμούς, η β' πτήση του εντόμου σε όλες τις περιοχές. Εάν απαιτείται επαναληπτική επέμβαση, μπορείτε να επέμβετε στις παρακάτω ημερομηνίες:
Πρώιμες περιοχές: Τέλος Ιουνίου. Όψιμες περιοχές: Αρχές Ιουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων

Όλα τα δελτία αναρτώνται στον διαδικτυακό κόμβο του υπουργείου www.minagric.gr
Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkrfpatr@otenet.gr