

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Πληροφορίες: Ν.Ι.Μπαγκής - Ε.Α.Αλατσοτιανός

1.

Στις ορεινές περιοχές (Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσόνα, Οροπέδιο Λασιθίου) στις μηλιές οι οφθαλμοί ανοίγουν (στάδια Γ- Δ₃) και στις αχλαδιές η άνθηση ξεκίνησε (στάδια Ε₂ - Ζ₂).

ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

			
Λευκή κορυφή (E ₂)	Έναρξη άνθησης (Z)	Πλήρης άνθηση (Z ₂)	

ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ

			
Φούσκομα (Γ)	Έκπτυξη (Δ - Δ ₃)	Πράσινη κορυφή (Δ ₃ -Ε)	Ρόδινη κορυφή (Ε ₂)



Βακτηριακό κάψιμο. Προσβολή στα άνθη.



Βακτηριακό κάψιμο. Σε νεαρό βλαστό.

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>) (<i>Venturia pirina</i>) (ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Την περσινή χρονιά, οι προσβολές στις αχλαδιές ήταν λίγες. Στις μηλιές η ασθένεια διαπιστώθηκε μόνο στο οροπέδιο Λασιθίου. - Οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τώρα δεν ευνόησαν την ασθένεια. - Κρίσιμη περίοδος για πρώτες μολύνσεις είναι μέχρι το στάδιο του καρπιδίου. Κτήματα χωρίς πρώτες μολύνσεις μένουν καθαρά όλη τη χρονιά, ακόμα κι αν υπάρχουν γειτονικά προσβεβλημένα. - Πρώτες μολύνσεις στη μηλιά γίνονται μόνο με βροχή ενώ στην αχλαδιά και με έντονες δροσιές. Πιθανές βροχές το διήμερο 7 - 8 Απριλίου. - Στις θερμοκρασίες της εποχής, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται να είναι συνεχόμενα βρεγμένα τα φύλλα ώστε να γίνουν μολύνσεις είναι 15 - 18 ώρες. <p>Οδηγίες: <u>Παρακολουθείτε ανελλιπώς τα δελτία καιρού.</u> Σε περίπτωση πρόβλεψης βροχής κάνετε προληπτικό ψεκασμό πριν ή εφόσον βρέξει εντός 48 ωρών, με κατάλληλα μυκητοκτόνα.</p>
<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>) (ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Το βακτήριο είναι εγκατεστημένο στις αχλαδιές της Κρήτης. - Η ασθένεια ευνοείται με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση και το βακτήριο μεταφέρεται με τον άνεμο, τα έντομα και τα εργαλεία. - Η σταδιακή άνοδος των θερμοκρασιών, το στάδιο της άνθησης που διανύουμε και οι προβλέψεις βροχών το διήμερο 7 - 8 Απριλίου ευνοούν την ασθένεια. <p>Οδηγίες: <u>Στην άνθηση:</u> Προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές με εγκεκριμένα σκευάσματα. Στον κατάλογο των ήδη εγκεκριμένων προστέθηκαν νέες δραστικές.</p> <p><u>Μετά την άνθηση:</u> Τακτικοί έλεγχοι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν δείτε ύποπτα συμπτώματα (μικρά ή μεγάλα τμήματα σαν καμένα από φωτιά, κυρίως στα άνθη) να αφαιρείτε τα ύποπτα μέρη μόνο με ξηρό καιρό ολόκληρα, προσεκτικά, μαζί με υγιές τμήμα 20 - 25 εκ. και να τα καίτε άμεσα.</p> <p>Τα εργαλεία πρέπει να απολυμαίνονται διαρκώς κατά την αφαίρεση των ύποπτων τμημάτων με οινόπνευμα του εμπορίου.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών των μηλοειδών για το έτος 2014, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο.** Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

*Ηράκλειο 3 Απριλίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης*