

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224629
Fax: 2610.623238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΕΛ: 2/7-3-2013

Βλαστικά στάδια: **Πρώιμες:** Στάδιο Γ (Σχηματισμός ανθοφόρου τσαμπιού)
Μεσοπρώιμες- όψιμες περιοχές: Στάδιο Β (Φούσκωμα οφθαλμών)



Β



Γ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ:

Συμπτώματα: Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται κυκλικές κηλίδες χρώματος καφεκίτρινου και στη συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.



Κυκλοκόνιο σε φύλλο ελιάς
(πηγή: ge-manews.blogspot.com)



Κυκλοκόνιο σε φύλλα ελιάς
(πηγή: report24.gr)

Συνθήκες
μόλυνσης:

Ο μύκητας εντοπίζεται στις κηλίδες που έχουν δημιουργηθεί στο παλαιό φύλλωμα και για να γίνει επέκταση των προσβολών στη νέα βλάστηση πρέπει να επικρατούν ευνοϊκές θερμοκρασίες. Η άριστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 15-20°C και σχετική υγρασία >80%. Επίσης ευνοούνται προσβολές όταν τα φύλλα παραμένουν βρεγμένα από βροχή τουλάχιστον 24 ώρες.

Επικρατούσες
συνθήκες:
Συστάσεις:

Ο καιρός προβλέπεται άστατος και οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές, συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν μολύνσεις από την ασθένεια.

**Ψεκασμός στις ευαίσθητες ποικιλίες, στα ελαιοκομεία που ενδημεί η ασθένεια, για να προστατευθεί η νέα βλάστηση, μέχρι να αποκτήσει μήκος 1,5-2 εκατοστά.
Σε περίπτωση δυνατής βροχόπτωσης να επαναληφθεί η επέμβαση.**

ΚΑΠΝΙΑ:

Διαπιστώσεις:

Οι προσβολές που έγιναν πέρυσι από διάφορα έντομα (π.χ. λεκάνιο), έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση Καπνιάς (μαυρίλας) στα ελαιόδενδρα.

Συστάσεις:

Ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο εκεί που διαπιστώνεται Καπνιά.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:

Διαπιστώσεις: Οι προνύμφες της φυλλόβιας γενεάς αρχίζουν να βγαίνουν από τους στοές τους στα φύλλα όπου διαχείμασαν και τρώνε την τρυφερή βλάστηση, μέχρι να συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους. Οι ζημιές που προκαλούνται αυτή την εποχή δεν είναι σοβαρές και δεν έχουν καμία επίπτωση στην αναμενόμενη παραγωγή των δένδρων.

Συστάσεις: **Δεν συνιστάται καμία επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη αυτή την περίοδο.**

ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ:

Διαπιστώσεις: Στις ελιές ορισμένων περιοχών παρατηρούνται σοβαρές ζημιές, τις οποίες αποδίδονται στο έντομο Καλόκορις.

Συμπτώματα: Όλη η ταξιανθία (μούρο) ή τμήμα της, κόβεται από τη βάση και πέφτει.

Συστάσεις: **Συνιστάται να γίνει προληπτική καταπολέμηση αρχές της άνοιξης, μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές τα προηγούμενα χρόνια.**

Φάρμακα: **Στις λίστες των μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων.**

ΣΗΜ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

