

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, προκειμένου να επιταχύνουμε το άνοιγμα, να πετύχουμε καλή συγκομιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαμβακιού. Επίσης, μόνο αποφυλλωμένο (και στεγνό) βαμβάκι, μπορεί να αποθηκευτεί.

Για εφέτος, η επέμβαση αυτή είναι εντελώς επιβεβλημένη, λόγω της οψιμότητας της χρονιάς. Καλούμε λοιπόν τους βαμβακοπαραγωγούς να μην παραλείψουν να κάνουν αποφυλλώσεις, λαβαίνοντας υπόψη τα παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα αποφυλλωτικά πρέπει να ψεκάζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον, το 50% των καρυδιών. Πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και πολλές φορές και το ίδιο το άνοιγμα (παρατηρείται μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίηση). Από την άλλη μεριά, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά, χρειάζονται καλές θερμοκρασίες (μεγαλύτερες των 15-18 °C).

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να βρούμε την χρυσή τομή ανάμεσα στην καθυστέρηση της εφαρμογής (για να προχωρήσει το άνοιγμα) και την έγκαιρη εφαρμογή, για να προλάβουμε την πτώση των θερμοκρασιών. Συμβουλευόμαστε για το σκοπό αυτό τις μετεωρολογικές προβλέψεις μακράς διάρκειας και όσο προβλέπεται ζεστός καιρός, καθυστερούμε την εφαρμογή.

Σε πολύ αναπτυγμένες ή όψιμες φυτείες, που δεν ανοίγουν ενώ περνάει ο καιρός, δεν μπορούμε να περιμένουμε το παραπάνω ποσοστό ανοίγματος και εφαρμόζουμε ωριμαντικά ή μισή δόση αποφυλλωτικού, έστω και αν το άνοιγμα είναι μόνο 10 -20 %. Έτσι, θα πέσει ένα μέρος του φυλλώματος και δια του αερισμού θα βοηθηθεί το άνοιγμα, αλλά θα διατηρηθούν και αρκετά φύλλα για να ολοκληρωθεί η θρέψη των καρυδιών. Στη συνέχεια, όταν το άνοιγμα προχωρήσει στο 50% και αν υπάρχουν ακόμα αρκετά φύλλα, κάνουμε δεύτερη εφαρμογή.

Προϋποθέσεις για πετυχημένη αποφύλλωση

- Φυτά με όσο το δυνατόν υγιή, πράσινα φύλλα σε λειτουργία
- Να επικρατήσει, 4-5 μέρες μετά την εφαρμογή, καιρός με ηλιοφάνεια, καλές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας και αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία .
- Καλή ποιότητα ψεκασμού (καλή διαβροχή των φύλλων με μπέκ «ομπρέλας», με το σωστό μέγεθος σταγονιδίων που δεν θα απορρέουν).

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφυλλωτικά

KABUKI 2.5EC	10	κ. εκ./στρέμμα	+	5 κ.εκ.	Silwet (διαβρεκτικό)
SPOTLIGHT	12,5	»	+	200 κ. εκ.	Εθεφόν

Ωριμαντικά

Εθεφόν :	250-350	κ. εκ./στρέμμα
----------	---------	----------------

Σεπτέμβριος 2014

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τηλέφωνα: 23213 – 55258, 55260, 55126, 55209, 55207,
55211, 55213, 55247