



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
Τηλ. : 2510 600421
Fax: 2510 600423
E mail : miliadou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ, τη ΔΑΟΚ Σερρών και το ΙΓΒ & ΦΠ Θεσ/κης

No 09/13-04-2018

Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου, Δημήτρης Συρόπουλος, Στέλλα Σπύρογλου και κατά τόπους ΔΑΟΚ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ευρύτομο Αμυγδαλιάς

Διαπιστώσεις:

Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα, διαπιστώθηκε ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η έξοδος του ευρύτομου της αμυγδαλιάς.



Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί 20 - 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς.

Συστάσεις:

Επειδή τα εξειδικευμένα διασυστηματικά εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στο στάδιο της νεαρής προνύμφης έχουν ανακληθεί, θα πρέπει η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας στα ενήλικα πριν αυτά προλάβουν να ωοτοκήσουν στους καρπούς. Συνεπώς συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν άμεσα στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια στις όψιμες με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπισή του.


Οι ψεकाσμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας όπου παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενηλίκων ατόμων και να επαναλαμβάνονται κάθε 7 - 8 ημέρες μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Τέξας που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη καρπότητα.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες : Deltamethrin, Phosmet.

το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

www.minagric.gr



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου