



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

9/9-3-17

### Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

#### Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς

Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ
BBCH SCALE	57	59	65	69	71

#### 1. ΜΟΝΙΛΙΑ

**Διαπιστώσεις:** Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια, και όλες οι ποικιλίες των παραπάνω πυρηνοκάρπων είναι ευαίσθητες στις προσβολές.

**Οδηγίες:** Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν να γίνει επέμβαση χρησιμοποιώντας φ.π και με θεραπευτική δράση.

**ΦΥΤ/ΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:** Βλέπε δελτίο 5/ 20-2-17.

#### 2 .ΚΟΡΥΝΕΟ

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Στη βερικοκιά πιο σημαντική είναι η προσβολή των οφθαλμών, των φύλλων και των καρπών.

**Διαπιστώσεις:** Οι παρούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

**Συμπτώματα:** Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

**Οδηγίες:** Στις υπερπρώιμες ποικιλίες να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την μονιλια. Στις υπόλοιπες ποικιλίες, να γίνει προληπτική επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

**ΦΥΤ/ΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Θιράμ, Κάπταν.



## **Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ**

### **1.ΜΟΝΙΛΙΑ - ΕΞΩΑΣΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις**      Στις υπερπρώιμες ποικιλίες νεκταρινιάς –ροδακινιάς υπάρχουν  
**Οδηγίες:**            προσβολές. Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν να  
                                 επέμβετε άμεσα με χρήση μυκητοκτόνου με προστατευτική και  
                                 θεραπευτική δράση.

**Φυτ/κά**  
**προϊόντα:**            Βλέπε δελτίο 5/ 20-2-17.

### **2.ΩΙΔΙΟ**

**Διαπιστώσεις:**      Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των  
**Οδηγίες:**            πετάλων και μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι  
                                 καθοριστικό για την ασθένεια. Θερμοκρασίες πάνω από 21° C ευνοούν  
                                 τον μύκητα, με άριστο τους 21-27 °C.

**Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στην ασθένεια. Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**      Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που  
                                 αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
                                 Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

### **3. ΘΡΙΠΕΣ**

**Οδηγίες:**            Ελέγχουμε δύο άνθη από 50 δένδρα. Απαιτείται επέμβαση στην πτώση  
                                 των πετάλων, όταν στο 5% των ανθέων υπάρχουν ακμαία και νύμφες  
                                 θριπών.

**Φυτ/κά**  
**προϊόντα:**            **Ροδακινιά- Νεκταρινιά:** Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν,  
                                 Αμπαμεκτίν + Χλοραντρανιλιπρόλ, *Beauveria Bassiana strain atcc 74040*,  
                                 Δελταμεθρίν, Λάμντα συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ,  
                                 Σπιροτετραμάτ, Φορμετανείτ.

**Δαμασκηνιά:** Αμπαμεκτίν, *Beauveria Bassiana strain atcc 74040*,  
                                 Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**