



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

35/23-06-15

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1. ΦΥΛΛΟΥΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου στις πρώιμες περιοχές. Το πρώτο και καθοριστικό για την παραγωγή κύμα βλάστησης, έχει «ψηθεί».

Οδηγίες: **A. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία:**

Καλλιεργητικά μέτρα:

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Χημικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται

B. Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμφόλια:

Εφόσον διαπιστώσετε έναρξη της δραστηριότητας του εντόμου (ύπαρξη στοών), να ξεκινήσετε επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.

Φυτ/κά προϊόντα:

1. Πορτοκαλιά: Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μιλμπεμεκτίν* {*Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία**},

2. Μανταρινιά : Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφenoζάιντ*, { *Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία**}.

3. Λεμονιά: Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω *Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Χλοραντρανιλιπρόλ* - **μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία**}.

4. Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς : *Ασεταμιπρίντ*

Το *Θιαμεθοξάμ* μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

2. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: **Να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στα όψιμα πορτοκάλια και μανταρινία που δεν έχουν συγκομισθεί.**

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

3. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: **Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση.**

Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη. ►

4.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Προσβάλλουν φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση ορισμένων σκευασμάτων (πυρεθρινοειδών) η οποία εντείνει τις προσβολές, λόγω της αύξησης της γονιμότητας των τετρανύχων που επιφέρει η χρήση τέτοιων σκευασμάτων .

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν προσβολές (σε αρκετούς οπωρώνες σοβαρές) με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων.

Οδηγίες: **Να γίνει επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).**

Φυτ/κά προϊόντα: *Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφenaζέιτ, Πυρινταμπέν (μόνο στην πορτοκαλιά), Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), Τεμπουφενπυράντ, Φενπιροξιμέιτ, Θερινά λάδια.*

**Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Σπιροντικλοφέν* χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. **Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ