

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΑΜΠΕΛΙ



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγες (διακρίνεται η τρύπα και τα αποχωρήματα).

Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση στα σταφύλια.

Ωίδιο. Συμπτώματα σε ράγες αλλά και σε άξονες – μίσχους στα σταφύλια.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Βαγγέλης Α. Αλατοσιανός

19.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)

Οδηγίες:

Η τρίτη πτήση ξεκίνησε στις **πρώιμες** και στις **ενδιάμεσες περιοχές**. Για την ώρα καταγράφονται μικροί πληθυσμοί και αραιές ωτοκίες. Είναι η πιο επιζήμια γενιά του εντόμου. Οι προσβολές συνδέονται με σοβαρές ζημιές στα σταφύλια από όξινη σήψη ή βοτρώτη.

Συνιστάται επέμβαση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

- **Πρώιμες περιοχές** (όπως Σητεία, Πισκοκέφαλο, Χερσονήσος, Μάλια, Γούβες, Καρτερός, Γάζι, Τυμπάκι, Καμηλάρι κλπ) :

➤ Επιτραπέζια: **7 - 8 Ιουλίου.**

➤ Σουλτανίνες - Οινάμπελα: **9 - 10 Ιουλίου.**

- **Ενδιάμεσες περιοχές - Κάτω Μεσσαρά** (όπως Καλέσα, Βούτες, Μαλάδες, Βασιλειές, Σπήλια, Βάθεια, Ελιά, Καπαριανά, Βόροι κλπ) :

➤ Επιτραπέζια: **8 - 9 Ιουλίου.**

➤ Σουλτανίνες - Οινάμπελα: **10 - 11 Ιουλίου.**

Η οδηγία για την ευδεμίδα αφορά μόνο τα αμπέλια που βρίσκονται στην πρώιμη και ενδιάμεση ζώνη. Για τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)	Εμφανίζονται υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου. Να συνεχιστεί η προστασία δίνοντας μεγάλη σημασία στην εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus ficus</i>) <i>Οδηγίες:</i>	Ελέγχετε τα αμπέλια, ιδιαίτερα αυτά που έχουν ιστορικό προσβολών. Σε σταφύλια για επιτραπέζια χρήση που εντοπίζονται πληθυσμοί μπορεί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Επισημαίνεται ότι αποτελεσματική αντιμετώπιση γίνεται μέχρι το «κλείσιμο» των σταφυλιών.
ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>) <i>Οδηγίες:</i>	Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ασθένεια. Οι ρώγες των σταφυλιών προσβάλλονται μέχρι και το γυάλισμα . Οι μίσχοι και οι άξονες των σταφυλιών προσβάλλονται όλη τη βλαστική περίοδο υποβαθμίζοντας εμπορικά τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των αμπελιών.

Ε Λ Ι Α



Προσβολή μαργαρόνιας στη νεαρή βλάστηση και σε καρπό.

Έντονη προσβολή μαργαρόνιας στην τρυφερή βλάστηση δέντρου που έχει δεχτεί αυστηρό κλάδεμα.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιουάκη

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: (<i>Palpita unionalis</i>) <i>Οδηγίες:</i>	Παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης. Η αλληλοκάλυψη των γενιών, η αδηφαγία των προνυμφών και η παραμονή τους σε προστατευμένα σημεία, μέσα στα τυλιγμένα φύλλα ή στη σάρκα του καρπού καθιστούν την αντιμετώπιση του εντόμου δύσκολη. Οι προνύμφες όσο μεγαλώνουν γίνονται περισσότερο ανθεκτικές στα εντομοκτόνα. <ul style="list-style-type: none"> - <u>Νεαρά δέντρα σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και δέντρα που έχουν δεχτεί κλάδεμα ανανέωσης πρέπει να ελέγχονται και όπου διαπιστώνονται προσβολές να προστατεύονται.</u> - Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού για όλες τις περιοχές : 7 - 9 Ιουλίου.
---	--

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 3 Ιουλίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρολλάκης Γιάννης