


ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707
Fax: 26510 41902



ΑΜΠΕΛΙ



D

E

F

G

H

L

M

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

6. 23/ 6 /2014

Βλαστικό στάδιο : **Λευκάδα, Κέρκυρα, Σακελαρικό Ιωαννίνων: Καρπόδεση.**
Ζίτσα Ιωαννίνων: Άνθηση.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι προσβολές είναι γενικευμένες πλέον σε όλες τις περιοχές. **Να συνεχιστεί η προστασία όσο οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας.** Στους αμπελώνες που είχαν προστατευτεί επαρκώς και δεν έχουν μολυνθεί, μπορεί να γίνεται στο εξής και χρήση φαρμάκων με δράση αποκλειστικά επαφής (χαλκούχα). Αντίθετα σε αμπελώνες με διαπιστωμένη προσβολή να προτιμούνται σκευάσματα με θεραπευτική δράση.

Καλό είναι σε όσους αμπελώνες έχουν διαπιστωθεί κηλίδες να γίνει ξεφύλλισμα στην περιοχή των σταφυλιών.

Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε. λίστα που σας έχει σταλεί. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ως προς την διαχείριση ανθεκτικότητας.

ΩΙΔΙΟ

Οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι ιδανικές για όλες τις περιοχές και τα διαστήματα ανάμεσα στις εφαρμογές και ανάλογα με τα σκευάσματα πρέπει να είναι τα μικρότερα δυνατά :

-Επαφής (θείο βρέξιμο ή επίπασης) ανά 7 ημέρες.

-Διασυστηματικά και διεισδυτικά σκευάσματα ανά 10-14 ημέρες.

Κατάλληλα σκευάσματα βλέπε λίστα ΔΓΠ 2/28-3-2014. Είναι επιβεβλημένο να εναλλάσσονται τα σκευάσματα ως προς τον τρόπο δράσης από ψεκάσμο σε ψεκάσμο.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στα βλαστικά στάδια πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού και στο «γυάλισμα» του σταφυλιού, να γίνουν ψεκασμοί με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα Μαλαγουζιά κ. α.) και στα αμπέλια που σημειώνονται σαπίσματα κάθε χρονιά. Οι εφαρμογές σκευασμάτων μπορεί να στοχεύουν μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με την καταπολέμηση του ωιδίου (σ' αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή γίνεται σε όλη την βλαστική επιφάνεια).

Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε Λίστα που σας έχει σταλεί.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Στην περιοχή της Ζίτσας οι πληθυσμοί είναι πολύ μικροί, και κανένας ψεκασμός δεν είναι επιβεβλημένος.

Η πτήση της δεύτερης γενιάς εξελίσσεται στην Λευκάδα και την Κέρκυρα. Σε αμπελώνες όπου κατά την πρώτη γενιά βρέθηκαν με καταμέτρηση πάνω από 20-30 φωλιές διατροφής σε 100 τσαμπιά μπορεί να γίνει 1 ψεκασμός με την λήψη του δελτίου. Στις αρχές Ιουλίου να γίνει καταμέτρηση των φωλιών διατροφής-προσβολών σε όλους τους αμπελώνες .

Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε Λίστα που σας έχει σταλεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα (βλέπε λίστα ΔΓΠ 2.28/3/2014), να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν, μην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων. Να γίνονται εναλλαγές στη χρήση των ομάδων και των κατηγοριών των σκευασμάτων ως προς τον τόπο Δράσης για να προληφθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ασθενειών στα φάρμακα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:

(<http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina>).