



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

39 /9-7-15

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις: Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές: Από 13 έως 16 Ιουλίου

β) Όψιμες περιοχές: Από 17 έως 20 Ιουλίου .

Φυτ/κά προϊόντα: *Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ* (μόνο σε πορτοκαλιά και Γκρέιπ φρούτ). Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγίες: **Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την κόκκινη ψώρα.**

Φυτ/κά προϊόντα: *Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ* (μόνο σε πορτοκαλιά και Γκρέιπ φρούτ) .

3.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος. Να συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινών. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια του φ.π που χρησιμοποιείτε. Βλέπε δελτίο **26 /14-5-15.**

4.ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγίες: **Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.**

Φυτ/κά προϊόντα: *Θερινός πολτός.*

5.ΛΕΚΑΝΙΟ

Οδηγίες: **Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.**

Φυτ/κά προϊόντα: *Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*



6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 35 /23-6-15.

7. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές. Επέμβαση απαιτείται όπου υπάρχουν προσβολές (ύπαρξη κινητών μορφών στο 20-30% των φύλλων).

Φυτ/κά

προϊόντα: Βλέπε δελτίο 35/23-6-15.

8. ΑΦΙΔΕΣ

Διαπιστώσεις: Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα). Υπάρχουν σποραδικές προσβολές στο νέο κύμα βλάστησης, όπως και έντονη δράση ωφελίμων παρασίτων και αρπακτικών.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση, συνεκτιμώντας και την δράση των ωφελίμων. Στις μανταρινιές προκαλείται άμεση ζημιά.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, Λάμντα συαλοθρίν, Ντιμεθοείτ, Πιριμικάρμη, Πυρεθρίνς, {Πυμετροζίν μόνο στην πορτοκαλιά}, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα αρπακτικά και παράσιτα, που βρίσκονται σε δραστηριότητα.**
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ