

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΚΕ: 4/9-5-13

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΡΑΓΟΛΕΤΗΣ: (Σκουλήκι των κερασιών)

Διαπιστώσεις: Τα κεράσια είναι επιδεκτικά προσβολής όταν αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα, από κίτρινο σε ρόδινο. Η ζημιά που προκαλείται είναι πολύ σοβαρή, ιδιαίτερα στα επιτραπέζια κεράσια. Οι πρώιμες ποικιλίες είναι ανθεκτικότερες στην προσβολή από το έντομο.

Συστάσεις: **Στις πρώιμες ποικιλίες που συνήθως δεν προσβάλλονται από το Ραγολέτη δεν χρειάζεται καμιά επέμβαση.**

Στις όψιμες ποικιλίες να γίνει καταπολέμηση του εντόμου με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα στο στάδιο έναρξης αλλαγής χρώματος καρπού.

Στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα **Μποβέρια Μπασιάνα** μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.



Προσβολή από Ραγολέτη σε κεράσι
Πηγή: <http://greensupport.gr>



Προνύμφη Ραγολέτη μέσα σε κεράσι

ΜΟΝΙΛΙΑ: (Σάπσισμα καρπών)

Συμπτώματα: Ο μύκητας μπαίνει από τα σκασίματα που προκαλούνται από ακανόνιστα ποτίσματα, έντονη βροχόπτωση μετά από περίοδο ξηρασίας ή χαλάζι.

Συστάσεις: **Να σταματούν τα ποτίσματα μερικές ημέρες πριν τη συγκομιδή.**
Να γίνει προληπτικός προστατευτικός ψεκάσμος τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Φάρμακα: *Στις λίστες των μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων που σας έχουν αποσταλεί.*

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρούνται σχολαστικά τα όρια των ψεκασμών από τη συγκομιδή, για να μην υπάρχουν υπολείμματα φαρμάκων στους καρπούς.

ΣΗΜ.1: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

ΣΗΜ.2: Όλα τα δελτία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Internet (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ