



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας  
Τηλ.: 26510 40707

Να κρατηθεί  
σε αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) για την καλλιέργεια της  
ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΑΣΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ		+	+				+	+	+				3
ΑΛΦΑ-ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ												+	Δολωμ.ψεκ.7
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ (Βιολογικό)	+												0
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	+		+	+			+					+	Δολωματικοί + καλύψεως 7
ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ												+	Δολωματικοί + καλύψεως 14
ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ + ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	+	καρπόβια										+	Δολωματικοί + καλύψεως 14
ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ + ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+	καρπόβια		+									7
ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+											+	-Δολωμ..ψεκασμοί για δάκο 7 ημέρ. -Ψεκ.καλύψεως 7 ή 14 ή 120 ημέρ. (ανάλογα με το σκεύασμα)
ΜΠΕΤΑ-ΣΙΦΛΟΥΘΡΙΝ	+				+				+	+		+	Ψεκ.καλύψ. 56 Δολωμ.ψεκ. 14
ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ (Βιολογικό)												+	0
ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ												+	Δολωματικοί + καλύψεως 28
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ		+	+			+	+	+			+		21
ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ			+										Πριν άνθηση
ΣΠΙΝΕΤΟΡΑΜ	+	καρπόβια											21
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ												+	Δολωμ.ψεκ.14

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΑΣΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΤΙΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ		+	+			+							14
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ			+										60
ΦΟΣΜΕΤ	+		+	+						+		+	21
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΩΣ ΜΕΘΥΛ	+		+										60

**Σημείωση :** Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκεύασμα σε συνδυασμό με φερομόνη και ελκυστικό τροφής που επιτυγχάνει μαζική προσέλκυση και θανάτωση του δάκου με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης του δάκου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις ελιές.

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

**Διαβάξτε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόξτε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Ιωάννινα, Απρίλιος 2018**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Καμπλέτσας

Τηλ.: 26510 40707

Να κρατηθεί  
σε αρχείο

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (**μυκητοκτόνα**) για την καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ	+			-Πριν άνθηση (βρώσιμες ελιές) -30 (ελαιοποιήσιμες ελιές )
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ *	+			21 ( 1 μόνον εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο)
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+			30
ΝΤΟΝΤΙΝ	+		+	15
ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	28 (ελαιοποιήσιμες ελιές )
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			1 μόνον εφαρμογή πριν άνθηση
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			14 (max: 2 εφαρμογές / 1 μόνον εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου)
ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	+			1 μόνον εφαρμογή την Άνοιξη
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΑΙΓΑΛΕΙΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ	+			21

\* Το ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στις ποικιλίες Καλαμών και Κορωνέικη.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Απρίλιος 2018