



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

15/23-4-18

ΕΛΙΑ

1. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Οδηγίες:

Καταπολέμηση συνιστάται μόνο σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (30-40% της κανονικής) και εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές προσβολές. Όπου κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση, να γίνει στο κρόκισμα (στάδιο F).

Φυτ/κά

προϊόντα:

Bacillus thuringiensis - Ενδείκνυται και για βιολογικές καλλιέργειες. Η επέμβαση να γίνει όταν έχει ανοίξει το 5% των ανθέων και να επαναληφθεί σε 7-10 ημέρες. **Ειδικά στις βιολογικές καλλιέργειες ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη κρίνεται αναγκαίος, σε κτήματα που παρουσιάζεται προσβολή, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου με σκευάσματα του Βάκιλλου δεν είναι αποτελεσματική.** Δελταμεθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Φοσμέτ Χλωρπυριφός μεθύλ.

2. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Οδηγίες:

Να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30% προσβεβλημένες ταξιανθίες).

Φυτ/κά

προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Δελταμεθρίν.

3. ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΒΛΑΣΤΩΝ

Το θηλυκό ωοτοκεί σε ομάδες, σε τραύματα και κυρίως σε σχισμές του φλοιού κλαδίσκων, που προκαλούνται από διάφορα αίτια (ωοτοκίες Cicadidae, Jassidae, χαλαζόπτωση κλπ). Οι προνύμφες ζουν ομαδικά στο χώρο του κάμβιου. Σημαντικές ζημιές μπορεί να προκαλέσει σε φυτώρια και σε νεαρά δένδρα. Σε παραγωγικά δένδρα οι ζημιές δεν είναι αξιόλογες. ►

Οδηγίες: Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων προτού οι προνύμφες πέσουν στο έδαφος. Αποφύγετε την δημιουργία πληγών στους βλαστούς (βοηθά έμμεσα στο να μην υπάρξουν προσβολές).

Σε νεαρά δένδρα, φυτώρια και νεαρά εμβόλια που υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση.

Φυτ/κά προϊόντα:

Μπέτα συφλουθρίν.

4. ΑΚΑΡΕΑ

Προσβάλλουν τους βλαστούς και τα φύλλα που εμφανίζουν παραμορφώσεις, και προκαλούν πτώση των ανθέων και των καρπών, αφού ο σχηματισμός των ταξιανθιών συμπίπτει με τη μέγιστη πληθυσμιακή τους πυκνότητα.

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς ελαιώνες. Ο βαθμός προσβολής ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού και την περιοχή.

Οδηγίες: **Για την αντιμετώπιση τους, σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές (5-10 άτομα ανά ταξιανθία), να γίνει επέμβαση πριν την ανθοφορία (κλειστή ταξιανθία).**

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινά λάδια.

5. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (Φλοιοτρίβης- Φλοιοφάγος)

Οδηγίες: **Καλλιεργητικά μέτρα:**

Αφαίρεση των μισόξερων ή ξερών κλάδων και κλαδίσκων και απομάκρυνση τους από τον ελαιώνα.

Τα ελαιόδενδρα να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση με εφαρμογή λιπάνσεων και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων.

Σε ελαιώνες με έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση αυτήν την εποχή

Φυτ/κά προϊόντα:

Μπέτα συφλουθρίν.

6. ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ)

Διαπιστώσεις: Από επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών.

Οδηγίες: **Σε επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς να γίνει επέμβαση από 26-30 Απρίλη.**

Να γίνει προσεκτικός και επιμελημένος ψεκασμός. Σε περιπτώσεις μεγάλων προσβολών να γίνει επανάληψη του ψεκασμού μετά από δύο εβδομάδες.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινά λάδια, {Σπιροτετραμάτ μετά την άνθηση} .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**