



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

17/7-4-14

### ΑΧΛΑΔΙΑ- ΜΗΛΙΑ

#### 1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

**Διαπιστώσεις :** Σε όλες τις περιοχές οι μηλιές και αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Ο καιρός που επικρατεί από χθες δημιουργεί συνθήκες για σοβαρή μόλυνση σε όλες τις περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων 16 Απρίλη στις πρώιμες περιοχές και 23 Απρίλη στις όψιμες ορεινές περιοχές.

#### Οδηγίες:

Επέμβαση σε μηλιές και αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

#### Φυτ/κά προϊόντα:

##### A. ΑΧΛΑΔΙΑ:

**1. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανκοζέμπ (όχι σε κρυστάλλι και Κόσια), Μετιράμ (όχι σε Κόσια), Ντιθιανόν(έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν(έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση).

##### **2. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:**

Θειοφανείτ-μεθύλ {1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο}, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν+ Κάπταν, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ.

##### B.ΜΗΛΙΑ:

**1. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Λαμιναρίν, Μανκοζέμπ (όχι σε Golden) , Μετιράμ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση, Προπινέμπ.

##### **2. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:**

Θειοφανείτ-μεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστρομπίν, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Ντιφενοκοναζόλ, Πυριμεθανίλ, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ+ Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ.

## **2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ**

**Διαπιστώσεις:** Οι προσβολές εφέτος είναι ελάχιστες και σποραδικές. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο.

**Οδηγίες:** Στα δένδρα που εντοπίζονται προσβολές, τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα, με αρκετό μέρος υγιούς ιστού. Να ακολουθεί επέμβαση με *Bacillus subtilis*–strain QST 713 ή

**Φυτ/κά προϊόντα:** Φοσετύλ αλ.

**ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ** συνεχείς επισκέψεις στα δενδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προσβολών.

Το *Λαμιναρίν* ενισχύει την αντίσταση του φυτού στο βακτηριακό κάψιμο.

## **3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ**

**Οδηγίες:** Δεν έχει ξεκινήσει η πτήση του εντόμου. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των ομάδων των δραστικών ουσιών για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**