

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Μύγα Μεσογείου. Νύγματα σε ρόγες



Μύγα Μεσογείου. Στοές που ξεκινούν από τα νύγματα



Μύγα Μεσογείου. Οι στοές είναι επιφανειακές

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Βαγγέλης Α. Αλατοσιανός

20.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Η τρίτη πτήση ξεκίνησε στις μεσοπρώιμες περιοχές. <u>Υπενθυμίζεται ότι είναι η πιο επιζήμια γενιά του εντόμου</u> και οι προσβολές προκαλούν ζημιές στα σταφύλια από όξινη σήψη ή βοτρυτή. Συνιστάται επέμβαση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:</p> <ul style="list-style-type: none">- Μεσοπρώιμες περιοχές (όπως Αρχάνες, Δαφνές, Βενεράτο, Αυγενική, Κ. Ασίτες, Αγ.Μύρων, Πενταμόδι, Κρουσώνας, Κυπαρίσι, Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήμι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, Γαρύπα, Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μυρτιά, Επισκοπή, Αγ.Παρασκιές, Αρκαλοχώρι κλπ) :➤ Επιτραπέζια: 12 - 14 Ιουλίου.➤ Σουλτανίνες - Οινάμπελα: 14 - 16 Ιουλίου.
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca decedens</i>)</p>	<p>Να συνεχιστεί η προστασία όπου υπάρχουν πληθυσμοί με εναλλαγή δραστικών ουσιών διαφορετικού τρόπου δράσης.</p>
<p>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (<i>Ceratitis capitata</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Στα διάσπαρτα οπωροφόρα (βερικοκιές, πορτοκαλιές, ροδακινιές κ.ά.) διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές και μεγάλοι πληθυσμοί που μπορούν να προσβάλλουν κατά την έξοδο τους και τα σταφύλια.</p> <p>Σε χονδρόρωγα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται κοντά σε οπωροφόρα, συνιστάται να τοποθετούνται παγίδες προσέλκυσης και θανάτωσης ή να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα με το μοναδικό εγκεκριμένο σκεύασμα για την μύγα στο αμπέλι Bulldock 25 SC (Beta Cyfluthrin).</p>

ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)	Υπενθυμίζεται ότι το ωίδιο προσβάλλει τις ράγες μέχρι και το <u>γυάλισμα</u> ενώ τους μίσχους και τους άξονες των σταφυλιών όλη τη βλαστική περίοδο υποβαθμίζοντας τα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση . Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.
--	---

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών του αμπελιού που σας έχουμε αποστείλει.
Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου με ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

Ηράκλειο 10 Ιουλίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης