



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

7/24-2-16

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς

Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ
BBCH SCALE	57	59	65	69	71

1. ΚΟΡΥΝΕΟ

Συμπτώματα: Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια. Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

Οδηγίες: Να γίνει προληπτική επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

**ΦΥΤ/ΤΙΚΑ
προϊόντα:** *Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.*

2. ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 4/17-2-16.

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ -ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 4/17-2-16.

2.ΩΙΔΙΟ

Διαπιστώσεις-Οδηγίες: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια. Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στην ασθένεια. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τον μύκητα. Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.



3. ΘΡΙΠΕΣ

Οδηγίες:

Ελέγχουμε δύο άνθη από 50 δένδρα. Απαιτείται επέμβαση στην πτώση των πετάλων, όταν στο 5% των ανθέων υπάρχουν ακμαία και νύμφες θριπών.

Φυτ/κά προϊόντα:

Ροδακινιά- Νεκταρινιά: *Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Beauveria Bassiana strain atcc 74040, Δελταμεθρίν, Λάμντα συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπιροτετραμάτ, Φορμετανέιτ.*

Δαμασκηνιά: *Αμπαμεκτίν, Beauveria Bassiana strain atcc 74040, Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν.*

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες:

Σε κτήματα που δεν έγινε φθινοπωρινή επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα, συνιστάται ψεκασμός μέχρι το στάδιο Γ (χρήση εγκεκριμένου για την καλλιέργεια χαλκούχου σκευάσματος) για προστασία από τις παραπάνω ασθένειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ