



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

5 /9-2-15

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

ΜΟΝΙΛΙΑ

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.

Βροχερός, ψυχρός ($T_a > 5^{\circ} C$) και νεφροσκεπής καιρός είναι κατ' εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων.

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.

Οδηγίες : **Άμεσος ψεκάσμος στις υπερπρώιμες ποικιλίες. Στις πρώιμες και όψιμες, να γίνει ψεκάσμος όταν φτάσουν στο ευαίσθητο στάδιο Γ.**

Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονίλια, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης .

Φυτ/κά

προϊόντα :

Θιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπασκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Τεμπουκοναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Βλαστικά στάδια



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65



1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι (στάδιο Γ) και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων και συνεπώς, αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα.

Άμεση επέμβαση στις υπερηρώιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα: *Ζιράμ* (.όχι στην νεκταρινιά), *Θειοφανεΐτ –μεθύλ* (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), *Θιράμ* (.όχι στην νεκταρινιά), *Ιπροντιόν*, *Κάπταν*, *Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν*, *Μυκλομπουτανίλ*, *Ντιθιανόν*, *Ντιφenoκoναζόλ* (από την πλήρη άνθηση BBCH 65), *Προπικoναζόλ*, *Προχλοράζ* -όχι στην νεκταρινιά (μέχρι την πτώση πετάλων στη ροδακινιά), *Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ* (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), *Συπροκoναζόλ* (.όχι στην νεκταρινιά), *Τεμπουκoναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν*, *Φλουοπυράμ+ Τεμπουκoναζόλ*, {*Χαλκούχο σκεύασμα* -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο εφόσον οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 7^ο C.

Φυτ/κά προϊόντα: *Βλέπε προηγούμενο δελτίο.*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονιλία, να προτιμάται η χρήση χαλκούχο σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
- ✓ Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού.
- ✓ Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (**www.minagric.gr**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ