



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

39/6-7-17

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Ξεκίνησε νέα πτήση του εντόμου στις πρώιμες περιοχές (παραλιακή ζώνη Π. Ε Κορινθίας. Επακόλουθο των προσβολών, αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες:

Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά

Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ -20 μέρες .

προϊόντα:

Β. Μέχρι τις 8 Ιουλίου με:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, { Μεθοξυφenoζάντ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτρ.},

{ Τεμπουφenoζάντ -21 μέρες},

{ Χλοραντρανιλιπρόλ -30 μέρες για οιν/μα & 3 μέρες για επιτρ.}.

{ Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ -30 μέρες για οιν/μα & 14 μέρες για επιτρ.}

Γ. Από 9 ως 11 Ιουλίου με:

{Άλφα υπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν- μπενζοειτ, Λάμδα Συαλοθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ -7 μέρες}, {Ιντοξακάρμπ -10 μέρες},

{Ετοφενπρόξ, Εσφενβαλερέιτ, Μπέτα Συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν -14 μέρες}, {Ταυ φλουβαλινείτ, Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Αναμένεται η έναρξη της πτήσης τις επόμενες ημέρες στις μεσοπρώιμες περιοχές. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες:

Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή. Σε αμπελώνες που η προηγούμενη επέμβαση δεν ήταν αποτελεσματική, να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Ο επαρκής φωτισμός και ο αερισμός, είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο.

Φυτ/κά

Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός – μεθύλ.

προϊόντα:

3.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα. Κίνδυνος προσβολών για τις ρόγες υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλισματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ όλη την καλλιεργητική περίοδο. ►

Απαιτείται συστηματικός έλεγχος των αμπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

{Σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* -0 μέρες }, { Διττανθρακικό Κάλιο-1 μέρα}, {Λαμιναρίν -0 μέρες }, {Θείο -7 μέρες}, {Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ -14 μέρες μόνο σε οινοποιήσιμα}{Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός - 28 μέρες}, {Μπουπιριμίτ, Μπουπιριμίτ+Τεμπουκοναζόλ, Προπικοναζόλ -14 μέρες},{Σπιροξαμίν -14 μέρες για επιτραπέζια & 35 μέρες για οινοποιήσιμα },{Αζοξιστρομπίν, Αζοξυστρομπίν+Τεμπουκοναζόλ, Μεπτυλντινοκάπ, Μυκκλομπουτανίλ, Ντιφenoκοναζόλ, Συφλουφenaμίντ, Τεμπουκοναζόλ Συφλουφenaμίντ+Ντιφenoκοναζόλ -21μέρες}, {Μετραφενόν, Προκουιναζίντ, Συπροκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν -28 μέρες},{Κυνοξιφέν -30 μέρες για οιν/μα & 21 μέρες για επιτραπέζια},{Κρεσοξυμ μεθύλ -42 μέρες}, {Μποσκαλίντ+Κρεσόξιμ μεθύλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ -35 μέρες}.

4.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες:

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των πληγών που δημιουργήσε ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών. Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία και έχουν υποστεί ζημιά από τον καύσωνα, να γίνει άμεσα προληπτική επέμβαση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Aureobasidium pulluans strain 14940 & 14941, *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* d747, {*Bacillus subtilis* strain-3 μέρες}, {*Eugenol+Geraniol+Thymol* -7 μέρες για επιτραπέζια & 3 μέρες για οινοποιήσιμα }, {*potassium hydrogen carbonate* -1 μέρα}, {Θιράμ -μόνο σε οινοποιήσιμα 35 μέρες}, {Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ -21 μέρες}, {Μποσκαλίντ-28 μέρες}, {Πυριμεθανίλ-35 μέρες}, {Συπροντινίλ -7 μέρες για επιτραπέζια & 21 μέρες για οινοποιήσιμα}, {Συπροντινίλ+ Τεμπουκοναζόλ-28 μέρες για επιτραπέζια & 21 μέρες για οινοποιήσιμα}, {Συπροντινίλ+ Φλουντιοξονίλ-21 μέρες μόνο για οινοποιήσιμα}, {Φενχεξαμίντ, Φενπυραζαμίν -7 μέρες για επιτραπέζια & 14 μέρες για οινοποιήσιμα}

5.ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ

Είναι μη παρασιτική «ασθένεια» που φαίνεται να έχει σχέση με την διαταραχή της ισορροπίας Ασβεστίου – Μαγνησίου – Καλίου, στη θρέψη του αμπελιού.

Στο ακραίο τμήμα του τσαμπιού οι ράγες μαραίνονται (μη τροφοδότηση με νερό) και στη συνέχεια η ράχη συρρικνώνεται και τελικά ξεραίνεται. Οι κλιματολογικές συνθήκες επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εμφάνιση της «ασθένειας».

Οδηγίες:

Καλλιεργητικά μέτρα που μπορεί να επιδράσουν θετικά στην προληπτική αντιμετώπισή της:

- Βελτίωση της υφής και της γονιμότητας του εδάφους με προσθήκη οργανικής ουσίας για την καλύτερη τροφοδοσία των πρέμνων με νερό.
- Κατάλληλο κλάδεμα και βλαστολόγημα (ζωηρά πρέμνα με γρήγορα αναπτυσσόμενη βλάστηση παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία.
- Αποφυγή πλούσιας λίπανσης (ιδιαίτερα της καλιούχου).

Σε αμπελώνες που υπάρχει το πρόβλημα να γίνει επέμβαση με άλατα μαγνησίου, η οποία να επαναληφθεί μετά από 10-15 μέρες. Να γίνεται καλή διαβροχή των σταφυλιών. ►

6.ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Προκαλείται από μικροοργανισμούς (ζύμες και βακτήρια που παράγουν οξικό οξύ) οι οποίοι πολλαπλασιάζονται πάνω σε πληγωμένες- από διάφορες αιτίες- ρόγες.

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, υπερβολικό φορτίο, την ύπαρξη πληγών στις ράγες και την αύξηση του πληθυσμού της Δροσόφιλας (μύγα του ξιδιού). Η Δροσόφιλα είναι ο κύριος φορέας των παθογόνων της ασθένειας.

Οδηγίες:

- **Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ασθένειας είναι η αποφυγή δημιουργίας πληγών στις ρόγες. Επομένως η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας, πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιμέλεια.**
- **Κλάδεμα, στήριξη σε πολλά σύρματα, με σκοπό την μείωση της υγρασίας και την καλύτερη δυνατή έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο.**
- **Προσοχή στις αρδεύσεις και στις λιπάνσεις, για τον έλεγχο της ζωηρότητας του πρέμνου.**
- **Επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα με σκοπό τη σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.**
- Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους εύρεσης υπολειμμάτων άνω των επιτρεπόμενων ορίων στα σταφυλια. **Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην ετικέτα, μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ