



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

23/7-5-15

Α.ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.

**Οδηγίες-
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέχρι 8 Μαΐου με: Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Φενοξυκάρμπ, Χλοραντρανιλιπρόλ.

2. Από 9 μέχρι τις 13 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες Μεθοξυφenoζάντ, Ντιφλουμπενζουρόν.

3. Από 14 ως 18 Μάη με:

Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 9 μέχρι τις 14 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 15 ως 18 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωλπυριφός μεθύλ.

2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Νάρκη: Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοςάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξικάρμπ, Φοσμέτ, Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.

Σέσια: Χλωρπυριφός.

3. ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων (πασχαλίτσες, χρύσωπες κλπ) να γίνεται επέμβαση με σκευάσματα που είναι φιλικά στα ωφέλιμα έντομα.

**Φυτ/κά
Προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Κλοθιανιντίν, Λάμπντα Συαλοθρίν, Πιριμικάρμπ, Σπιροτετραμάτ, Τ-φλουβαλινείτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ. ►

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

Φυτ/κά Προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2) , Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2)Μπιφεναζέιτ (1) Σπιροντκλοφέν (1) Τεμπουφενπιυράντ(1)

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνεται τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ