

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 6 / 10 Μαρτίου 2015

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ

A. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia inaequalis* Cooke Wint.)

- Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους μηλέωνες της περιοχής μας, διαπιστώθηκαν ώριμα ασκοσπόρια. Συνιστάται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα 13-16 Μαρτίου ή στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C έως C₃, εικόνα 1).
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Calcium copper sulfate, Captan, Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride, Cyproconazole, Cyprodinil, Difenoconazole, Dithianon, Dodine, Fludioxonil, Folpet, Kresoxim-methyl, Laminarin, Mancozeb, Maneb, Metiram, Myclobutanil, Propineb, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazole, Thiram, Triadimenol, Trifloxystrobin, Ziram.

B. ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψώρα του San José (*Quadraspidiotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae)


- Σε οπωρώνες με προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται επέμβαση με παραφινέλαια εναντίον της διαχειμάζουσας μορφής, στη διόγκωση των οφθαλμών έως το στάδιο της πράσινης κορυφής (B έως C₃, εικόνα 1).
- Με την εφαρμογή αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και μία σημαντική μείωση των χειμερινών αυγών του κόκκινου τετράνυχου, καθώς και καταπολέμηση των διαχειμαζόντων μορφών του Ανθονόμου της μηλιάς (*Anthonomus pomorum* L., Coleoptera: Curculionidae) και της Βαμβακάδας της μηλιάς (*Eriosoma lanigerum* Hausmann, Homoptera: Aphididae).

		
B φούσκωμα οφθαλμών, διαχωρισμός λεπιών	C πράσινη κορυφή	C₃ "αυτιά ποντικού" πράσινες κορυφές φύλλων εξέχουν από τα λέπια
Εικόνα 1. στάδια ΜΗΛΙΑΣ		

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia pirina* Aderhold)

- Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους αχλαδεώνες της περιοχής μας, διαπιστώθηκαν ώριμα ασκοσπόρια. Συνιστάται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα 13-16 Μαρτίου ή στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C₃ έως D, εικόνα 2).
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Captan, Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride, Cyprodinil, Difenoconazole, Dithianon, Dodine, Fludioxonil, Mancozeb, Metiram, Myclobutanil, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Thiram, Tribasic copper sulfate, Trifloxystrobin, Ziram.
- Εάν επιλεγεί Copper hydroxide ή laminarin επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη κάλυψη για το βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora* Burrill Winslow et al.)



**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα