



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

16/ 4-5-17

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η πρώτη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Μέχρι 7 Μάη με: *Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Φενοξυκάρμπ, Χλοραντρανιλιπρόλ.*

2. Από 8 μέχρι τις 11 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Βάκιλλος Θουριγγίας* (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), *Μεθοξυφenoζάιντ, Τεμπουφenoζάιντ.*

3.Από 12 ως 16 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα σουφλουθρίν, Σπινοςάντ, Σπινετοράμ, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 8 μέχρι τις 11 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 12 ως 16 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Σπινετοράμ, Χλωπυριφός μεθύλ, Χλωπυριφός.

Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει επέμβαση για την καρπόκαψα. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ

Διαπιστώσεις: Στις δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η έναρξη νέας γενιάς με ύπαρξη εναποθέσεις αυγών, έναρξη εκκολάψεων και ακμαία. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν το έντομο.

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά με δραστικές ουσίες που επιτρέπεται ο συνδυασμός, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης. ►

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν (δρά και σε ηλικιωμένες νύμφες N5), Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ (δρά σε αυγά και νύμφες), Ιμιντακλοπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύμφες), Σπινοςάντ, Σπιροτετραμάτ (δρα σε νύμφες), Σπινετοράμ (δρα σε νύμφες) , Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρά σε αυγά και νύμφες), Χλωλπιριφός μεθύλ.

3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Σε οπωρώνες που δεν υπάρχουν προσβολές να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προστατευτική δράση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

4. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες:

Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να λαμβάνονται τα αναφερόμενα σε προηγούμενο δελτίο καλλιεργητικά μέτρα.

5. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ

Οδηγίες:

Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

6. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες:

Στις καρυδιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 8 μέχρι τις 11 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ίός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 12 ως 16 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & Α.Α

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ