

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Ωίδιο. Προσβολή και αλευρώδες χνούδι (σπόρια) σε νεαρές ράγες.



Περονόσπορος. Κηλίδες ελαίου στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

8α.

Βλαστικά στάδια: Στην κύρια ποικιλία Ρωμείο και στην παραλιακή ζώνη έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση και τα σταφύλια έχουν μέγεθος «μικρού σκαγιού».

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>) Οδηγίες:	Στις πρώιμες – παραλιακές περιοχές του νομού Χανίων (Κολυμβάρι, Καστέλι Κισσάμου κλπ.) η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε. Συνιστάται αντιμετώπιση το διάστημα 8 - 10 Ιουνίου . Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια.
ΩΙΔΙΟ (σίρικας): (<i>Erysiphe necator</i>)	Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και τα σταφύλια συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις προσβολές και το χρονικό διάστημα από την καρπόδεση μέχρι και δυο εβδομάδες αργότερα. Να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>) Οδηγίες:	Δεν έχει κάνει έντονη την παρουσία του τη φετινή περίοδο. Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το μέγεθος μικρού μπιζελιού. Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί. Λόγω της ευαισθησίας των βλαστικών σταδίων του αμπελιού και της καιρικής αστάθειας να συνεχιστεί ο συστηματικός έλεγχος. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να γίνεται άμεσα καταπολέμηση.

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Οι επεμβάσεις να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

Το δελτίο αμπελιού για το νομό Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τ.Α.Α. Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες στο αμπέλι εναντίον της ευδεμίδας

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Στάδιο του εντόμου που δρα το εντομοκτόνο Α=αυγά Πρ=Προνύμφη	Χρόνος εφαρμογής	Μείγματα αυγών Σο23	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
1B	Chlorpyrifos	Πρ	Κατά την εκκόλαψη των αυγών	1	30
	Chlorpyrifos-methyl	Πρ		2	21
	Alpha-cypermethrin	Πρ		2	7 ή 14
	Beta-cyfluthrin	Πρ		2	14
	Cypermethrin	Πρ		1	21
	Cypermethrin	Πρ		2	7
	Deltamethrin	Πρ		3	7
	Esfenvalerate	Πρ		2	14
	Etofenprox	Πρ		3	14
	Lambda cyhalothrin	Πρ		2	9
	Lambda cyhalothrin	Πρ		2	7
	Pyrethrins	Πρ		3	2
22A	Indoxacarb	Πρ		3	10
5	Spinosad	Πρ		4	14
6	Emamectin benzoate	Πρ		3	7
	Abamectin	Πρ	2	28	
7B	Fenoxycarb	A, Πρ	Κατά την εναπόθεση των αυγών	2	20
18	Methoxyfenozide	A, Πρ		4	14 οиноποιησιμα 7 επιτραπέζια
	Tebufenozide	(A), Πρ		2	21
28	Chlorantraniliprole	A, Πρ		1 οινόπ. 2 επιτρ.	30 οινόποιησιμα 3 επιτραπέζια
	Chlorantraniliprole + Thiamethoxam	A, Πρ	1	30 οινόποιησιμα 14 επιτραπέζια	
11A	Bacillus thuringiensis (Βάκιλλος με επίπαση ή ψεκασμό κάλυψης)	Πρ	Με την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών	3 ή 4	0
	Δραστική παρεμπόδισης σύζευξης	Εναντίον αρσενικών	Με τις πρώτες συλλήψεις αρσενικών		-

Η ομαδοποίηση των δραστικών είναι σύμφωνη με τον διεθνή οργανισμό I.R.A.C.

Συνιστάται για την διαχείριση της ανθεκτικότητας η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική ομάδα δράσης.

Ηράκλειο 5 Ιουνίου 2015

Η Προϊστάμενη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη