

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν° 14

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε ενδιάμεση ζώνη - κάτω Μεσσαρά, όψιμες περιοχές.




Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Ευαίσθητα στάδια.

Περουόσπορος: Προσοχή κατά θέσεις και στις περιόδους με έντονες πρωινές δροσιές.


Τζιτζικάκι: Αύξηση πληθυσμών. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα μόνο μετά από έλεγχο.

Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggio lini			
		Στάδιο Κ ανάπτυξη ρωγών - κατακόρυφη θέση		Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών
		Πρώιμη ζώνη		Τα σταφύλια κλείνουν
		Μεσοπρώιμη	κατακόρυφη θέση - έναρξη κλεισίματος	
Όψιμη ζώνη	ανάπτυξη ρωγών-κατακόρυφη θέση			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσοαρά συνεχίζεται η δραστηριότητα (συλλήψεις, ωτοκίες).
- Στις όψιμες περιοχές καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και πυκνές ωτοκίες.

Οδηγίες :

Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσοαρά	• Επιτραπέζια : 18 - 19 Ιουνίου
---------------------------------	---------------------------------

Όψιμες περιοχές	• Επιτραπέζια : 20 - 21 Ιουνίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 23 - 25 Ιουνίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου και την εξάπλωση των μολύνσεων.

Οδηγίες :

- Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα και πρέπει να προστατεύονται.

- Σε αμπέλια με σοβαρές προσβολές να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη. Έχει καλή προληπτική και θεραπευτική δράση σε συνθήκες ηλιοφάνειας και θερμοκρασίας 18 - 25 °C. Προσοχή το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30 °C μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές με διαφορετική ένταση συμπτωμάτων.
- Για την εξάπλωση των μολύνσεων απαιτείται νερό (έντονες πρωινές δροσιές ή βροχές). Αυτή την περίοδο οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τον μύκητα.

Οδηγίες :

- Σε περιόδους με έντονες δροσιές, αμπέλια που υπάρχει η ασθένεια, πρέπει να προστατεύονται. Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με το ωίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια (υπάρχει όμως μεγάλη διαφοροποίηση από αμπέλι σε αμπέλι).

Οδηγίες :

- Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Σε περίπτωση αυξημένων πληθυσμών (όριο επέμβασης 50 - 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα) να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:
(*Planococcus ficus*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).
- Τα σταφύλια σταδιακά αρχίζουν να κλείνουν.

Οδηγίες :

- Να ελέγχονται τα αμπέλια, ιδιαίτερα αυτά με ιστορικό προσβολών. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών βοηθά στον εντοπισμό του.
- Σε επιτραπέζια σταφύλια που μετά από έλεγχο εντοπίζονται **πληθυσμοί** να γίνει επιμελημένος ψεκάσμος. Η αντιμετώπιση του εντόμου μετά το κλείσιμο των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [πλανόκοκκο πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη