

**№ 4 / 12 Μαρτίου 2013**Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία
Υφούλης Αντώνης**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ*****Spilocaea oleagina* (Castagne) Hughes**

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ιδανικές συνθήκες βλάστησης των κονιδίων του μύκητα.

Σε ελαιώνες που υπάρχουν φθινοπωρινές προσβολές (χαρακτηριστικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια) συνιστάται:

- άμεση επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα ή
- προληπτική επέμβαση όταν το μήκος της νέας βλάστησης θα είναι 2 - 5 εκατοστά.

Εάν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις να επαναληφθεί η επέμβαση για να προστατευθεί η νέα βλάστηση μέχρι να αποκτήσει μήκος τουλάχιστον 2 εκατοστά.

Σε ακλάδευτους ελαιώνες απαιτείται επίσης και επέμβαση μετά το κλάδεμα.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Calcium copper sulfate, Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride, Dodine, Tribasic copper sulfate.

Εάν επιλεγεί ο βορδιγάλειος και ο οξυχλωριούχος χαλκός να ληφθεί υπόψη ότι προκαλούν πτώση των προσβεβλημένων φύλλων. Ειδικότερα ο οξυχλωριούχος προκαλεί και πτώση υγιών φύλλων σε υγρές περιοχές. Συνιστάται η εφαρμογή του οξυχλωριούχου χαλκού να αποφεύγεται στις πολύ υγρές περιοχές.

Η φυλλόπτωση των προσβεβλημένων φύλλων σε ελαιώνες είναι επιθυμητή διότι λειτουργεί εξυγιαντικά, όμως σε πολύ προσβεβλημένους ελαιώνες μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην απόδοση των δέντρων και καλό είναι να αποφεύγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.



(Συμπτώματα κυκλοκόνιου)

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**