

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γεωργικές Προειδοποιήσεις**

Πληροφορίες : Νικόλαος Ι. Μπαγκής
Τηλ. : 2810.224948

Να κρατηθεί σε αρχείο

Κατάλογος Φυτοπροστατευτικών Μυκητοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες)
KRESOXIM - METHYL (ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ)	+			ελιές βρώσιμες: 2 ελιές ελαιοποιήσιμες: 3	ελιές βρώσιμες: πριν την άνθιση ελιές ελαιοποιήσιμες: 30
TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN (ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΒΙΝ)	+			1	εφαρμογή πριν την άνθιση
TRIFLOXYSTROBIN (ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΒΙΝ)	+			2	14
DIFENOCONAZOLE (ΝΤΙΦΕΝΟΚΑΝΑΖΟΛ)	+			2	30
DODINE (ΝΤΟΝΤΙΝ)	+		+	2	15
CALCIUM COPPER SULFATE, σε Cu (ΧΑΛΚΟΣ, ΒΟΡΑΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)	+	+	+	2	21
COPPER OXYCHLORIDE, σε Cu (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)	+	+	+	2	21
TRIBASIC COPPER, σε Cu (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)	+	+	+	2	21
COPPER HYDROXIDE, σε Cu (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)	+	+	+	2	21
COPPER OXIDE, σε Cu (ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)	+			2	21

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.). Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα. Συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ηράκλειο, Μάρτιος 2015