

# ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ-Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : ΤΕΡΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 651 10 Τ.Θ.: 1235

Τηλέφωνο : 2510 600421

Fax: 2510 600430

Email : pkpfpeka@otenet.gr

Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου

*Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά*

Σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

**ΕΛΙΑ**

№ 17/19-05-2017

## Βλαστικό στάδιο

Παρατηρείται έναρξη της ανθοφορίας της ελιάς σε πρώιμες περιοχές και ποικιλίες.

Στις υπόλοιπες πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο Ε (διαφοροποίηση της στεφάνης) και αναμένεται έναρξη της ανθοφορίας τις επόμενες ημέρες.

Τη φετινή χρονιά παρατηρείται διαφοροποίηση στην ποσότητα της ανθοφορίας λόγω του χειμερινού παγετού.



## Πυρηνοτρήτης

Η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη από το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Στις περιοχές της **νότιας** Σαμοθράκης και Θάσου, η ανθοφορία ξεκίνησε και ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι χαμηλός.

## Ψεκασμοί:

Οι επεμβάσεις έχουν ως στόχο τα ενήλικα πριν προλάβουν να γεννήσουν το μέγιστο των αυγών τους και τις προνύμφες πριν μπουν στο φυτό.

Σε περιοχές που υπάρχει αυξημένη ανθοφορία η επέμβαση για την καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου μπορεί να **παραληφθεί**.

Ταυτόχρονα θα διατηρηθούν και οι πληθυσμοί των φυσικών εχθρών που είναι δραστήριοι την εποχή της ανθοφορίας.

Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί σε περιοχές με μέτρια ανθοφορία ή σε ελαιώνες όπου εμφανίστηκαν και άλλοι εντομολογικοί εχθροί, όπως η βαμβακάδα οπότε μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση στα αγροκτήματα που εντοπίστηκε.

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα με **βάκιλλο θουριγγίας**, τα οποία είναι δραστικά εναντίον των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς και δεν βλάπτουν τους φυσικούς εχθρούς των βλαβερών εντόμων που είναι δραστήριοι την εποχή της ανθοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα) ή και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.

## Ψύλλα (βαμβακάδα)

Παρατηρήθηκαν χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί ψύλλας, κυρίως σε ελαιοκτήματα όπου δε γίνονται συστηματικοί ψεκασμοί. Όπου υπάρχει πρόβλημα βαμβακάδας να γίνει ένας ψεκασμός με εγκεκριμένο σκεύασμα παραφινελαίου, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

## Ακάρεα

Τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδέντρων, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

### Ψεκασμοί :

Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει το μέγεθος της κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασμός είναι απαραίτητος μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες.



## Παρλατόρια

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου λίγο πριν την ανθοφορία με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις επιτραπέζιες ποικιλίες και σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

### σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα τους.
- Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και εφαρμόζετε τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

♦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων



Η Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α.