

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



**Περονόσπορος.** Όψιμες προσβολές στο φύλλωμα.



**Σύμπλοκο ίσκας.** Σύμπτωμα «τίγρης» σε φύλλο.

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής - Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός

20.

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b> ( <i>Lobesia botrana</i> ) <i>Οδηγίες:</i>	<p>Μια νέα γενιά του εντόμου ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.</p> <p><b>Σταφύλια για επιτραπέζια χρήση που θα τρυγηθούν όψιμα πρέπει να προστατευθούν.</b></p> <p><b>Ημερομηνίες ψεκασμού : 17 - 18 Σεπτεμβρίου.</b></p> <p>Να προτιμηθούν σκευάσματα με μικρή υπολειμματική διάρκεια και να τηρηθούν αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν από τη συγκομιδή που αναγράφονται στην ετικέτα.</p>
<b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> ) <b>ΩΙΔΙΟ:</b> ( <i>Erysiphe necator</i> )	<p>Η εξασθένηση της βλάστησης και κυρίως η πρόωρη αποφύλλωση των αμπελιών λόγω της φετινής έντονης παρουσίας του περονόσπορου και του ωιδίου θα επηρεάσουν την παραγωγή της επόμενης χρονιάς.</p> <p>Για την προστασία του φυλλώματος από όψιμες προσβολές συνιστάται <b>συνδυασμένη αντιμετώπιση μετά τον τρύγο και με τις πρώτες βροχές</b> κατά προτίμηση με <b>χαλκούχα σκευάσματα και βρέξιμο θείο.</b></p>

**ΙΣΚΑ :**

Συμπτώματα του συμπλόκου της ίσκας παρατηρούνται κάθε χρόνο σε πολλά αμπέλια. Την περίοδο αυτή τα προσβεβλημένα πρέμνα είναι εύκολο να επισημανθούν καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως:

- Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδι και εμφάνιση τριχρωμίας με καστανή, χλωρωτική και πράσινη ζώνη - σύμπτωμα τίγρης).
- Σταδιακή ή απότομη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.
- Καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου σε τομή του βραχίονα.

*Οδηγίες:*

**Να γίνει η επισημανση των άρρωστων πρέμνων αυτή την περίοδο.**  
Δεν υπάρχει χημική αντιμετώπιση. Ο έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται με καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά τα χειμερινά κλαδέματα.

*Ηράκλειο 15 Σεπτεμβρίου 2015*

*Η Προϊστάμενη Τμήματος*

*Κληρονόμου Ευφροσύνη*