



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

5 /20-2-17


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Βλαστικά στάδια



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.

Βροχερός, νεφοσκεπής καιρός και θερμοκρασίες πάνω από 5⁰ C, είναι κατ' εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων.

Διαπιστώσεις: Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδια ευπρόσβλητα από την ασθένεια.

Οδηγίες : Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονιλια, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης .

**Φυτ/κά
προϊόντα :**

1.Βερικοκιά: Θιράμ, Θείο, Θειοφανεΐτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπασκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Μανκοζέμπ, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ, Τεμπουκοναζόλ Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα - μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2.Ροδακινιά: Ζιράμ, Θείο, Θειοφανεΐτ-μεθύλ(1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μανκοζέμπ, Μπασκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ , ►

Ντιφenoκoναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65),
Προπικoναζόλ, *Προχλοράζ* (μέχρι την πτώση πετάλων),
Συπροντινίλ, *Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ* (1 επέμβαση ανά
καλλιεργητική περίοδο), *Συπροκoναζόλ* , *Τεμπουκoναζόλ*
Τεμπουκoναζόλ+ Συπροντινίλ, *Φενπυραζαμίν*, *Φλουοπυράμ+*
Τεμπουκoναζόλ {*Χαλκούχο σκεύασμα* -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

3. Νεκταρινιά: *Θειοφανείτ -μεθύλ* (1 επέμβαση ανά
καλλιεργητική περίοδο), *Ιπροντιόν*, *Κάπταν*, *Μανκοζέμπ*
Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, *Μυκλομπουτανίλ* ,
Ντιφenoκoναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65), *Συπροντινίλ*
Προπικoναζόλ, *Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ* (1 επέμβαση ανά
καλλιεργητική περίοδο), *Τεμπουκoναζόλ*, *Τεμπουκoναζόλ+*
Συπροντινίλ , *Φενπυραζαμίν*, *Φλουοπυράμ+ Τεμπουκoναζόλ* ,
{*Χαλκούχο σκεύασμα* -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες:

Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου
φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το
τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να
είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο εφόσον οι
θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 7⁰ C.

Φυτ/κά

προϊόντα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι δραστικές ουσίες για την μονιλία που προλαμβάνουν τις
προσβολές από τον εξώασκο.

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονιλία, να προτιμάται
η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε
διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των
ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας
ανθεκτικότητας.
- ✓ Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του
ψεκασμού.
- ✓ Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες
χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (**www.minagric.gr**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ