



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

18 / 30-4-18

ΑΜΠΕΛΙ

1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Ο χθεσινοβραδινός καιρός δημιούργησε συνθήκες μόλυνσης για τους αμπελώνες της ευρύτερης περιοχής Νεμέας της Π.Ε Κορινθίας. Εμφάνιση κηλίδων «ελαίου» 8-10 Μάη.
Οδηγίες:

Στους αμπελώνες της περιοχής αυτής να γίνει άμεσα επέμβαση με την λήψη του δελτίου. Στις υπόλοιπες περιοχές να ενταθούν οι έλεγχοι για το επόμενο δεκαήμερο, με ιδιαίτερη προσοχή σε κτήματα που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες. Όπου διαπιστώνονται προσβολές να επεμβαίνετε άμεσα
Βλέπε δελτίο 12/10-4-18

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

2. ΩΙΔΙΟ

Ο κίνδυνος μολύνσεων από τον μύκητα είναι μεγάλος λόγω καιρικών συνθηκών. Να γίνονται συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί να καταστρέφονται και να ακολουθεί επέμβαση με κατάλληλο μυκητοκτόνο. Η εξασφάλιση καλού αερισμού μειώνει τις προσβολές.
Βλέπε δελτίο 9/19-3-18.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

3. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Ίδανικές συνθήκες για μολύνσεις είναι θερμοκρασίες 15-25 °C με βροχή ή υγρασία. Προσβάλλονται κορυφές βλαστών, βάσεις τρυφερών βλαστών, ταξιανθίες.

Οδηγίες: Σε περιοχές που υπάρχει ιστορικό προσβολών από τον μύκητα και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, να γίνει επέμβαση στο στάδιο του μούρου. Επέμβαση να γίνεται μετά από χαλαζόπτωση ή ισχυρούς ανέμους.

Καλλιεργητικά μέτρα

- Εξασφάλιση καλών συνθηκών αερισμού και φωτισμού.
- Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης.
- Καταστροφή των ζιζανίων.
- Συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι.
- Αποτελεσματική αντιμετώπιση ωιδίου, ευδεμίδας. ►

Φυτ/κά προϊόντα: *Aureobasidium pulluans strain 14940 & 14941 Bacillus subtilis strain, Eugenol+Geraniol+Thymol, potassium hydrogen carbonate, Θιράμ (μόνο σε οиноποιήσιμα), Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Πυριμεθανίλ, Συπροντινίλ+ Φλουντιοξονίλ, Φενχεξαμίντ, Φενπυραζαμίν, Φλουαζινάμ.*

4.ΘΡΙΠΕΣ

Οδηγίες: Με ελαφριά τινάγματα πάνω σε λευκό χαρτί ανθοταξιών λίγο πριν την άνθηση μπορείτε να διαπιστώσετε την πυκνότητα του πληθυσμού τους. Σε επιτραπέζιες ποικιλίες που θα διαπιστωθούν υψηλοί πληθυσμοί, να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα: *Άλατα λιπαρών οξέων, Αζαντιραχτίν, Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν, Ασεταμιπρίντ, Beauveria bassiana strain ATCC 74040, Λάμπντα συαλοθρίν, Μεθιοκάρμπ, Μπέτα- συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Τ-Φλουβαλινεϊτ, Φορμετανεϊτ.*

5.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες με εβδομαδιαίες δειγματοληψίες ως εξής: Από 20 πρέμνα στο στρέμμα επιλέγουμε ένα φύλλο από κάθε πρέμνο το οποίο παίρνουμε μεταξύ 2^{ου} ως 4^{ου} μεσογονατίου διαστήματος. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στις εξωτερικές γραμμές κοντά σε δρόμους. Επέμβαση χρειάζεται όταν στο 70% των φύλλων υπάρχουν προσβολές.

Φυτ/κά προϊόντα: *Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν, Beauveria bassiana strain ATCC 74040, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Σπιροντικλοφέν, Θερινά λάδια.*

6.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Οδηγίες: Αυτήν την εποχή η προνύμφη του εντόμου καταστρέφει άνθη. Μια καλή καρπόδεση προκύπτει από το δέσιμο 30-50% των ανθέων.

Σε αμπελώνες κυρίως επιτραπέζιων ποικιλιών που πέρυσι υπήρχαν σοβαρές προσβολές από το έντομο, πιθανόν να χρειάζεται επέμβαση αν σε έλεγχο 100 ανθοταξιών διαπιστωθούν 30 προνύμφες.

Φυτ/κά προϊόντα: *Βάκιλλο Θουριγγίας, Ακριναθρίν, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέϊτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοέϊτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα-Συαλοθρίν, Μπέτα - Συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν, Τ-Φλουβαλινεϊτ Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ.*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ