



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

8/8-3-18

### Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

#### Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς

<b>Δ</b>	<b>Ε</b>	<b>Ζ</b>	<b>Η</b>	<b>Θ</b>	<b>Ι</b>
<b>BVCH SCALE</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

#### **1. ΚΟΡΥΝΕΟ**

##### Συμπτώματα:

Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

##### Οδηγίες:

**Να γίνει προληπτική επέμβαση στην πτώση των πετάλων.**

##### Φυτ/τικά προϊόντα:

*Θιράμ, Κάπταν.*

#### **2. ΜΟΝΙΛΙΑ**

##### Οδηγίες:

**Βλέπε δελτίο 5/27-2-18.**

#### **Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ**

##### **1.ΜΟΝΙΛΙΑ -ΕΞΩΑΣΚΟΣ**

##### Διαπιστώσεις:

Στους επιτόπιους ελέγχους μας δεν διαπιστώθηκαν προσβολές στις υπερπρωιμες ποικιλίες των ανωτέρω πυρηνοκάρπων.

Σας θυμίζουμε ότι από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα εφόσον οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 7<sup>ο</sup> C

##### Φυτ/τικά προϊόντα:

**Βλέπε δελτίο 5/27-2-18.**



#### **2.ΩΙΔΙΟ**

**Διαπιστώσεις:**  
**Οδηγίες:**

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων και μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια. Θερμοκρασίες πάνω από 21° C ευνοούν τον μύκητα, με άριστο τους 21-27 °C.

**Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στην ασθένεια. Οι επικρατούσες συνθήκες δεν την ευνοούν ακόμη και ως εκ τούτου δεν απαιτείται επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

**3. ΘΡΙΠΕΣ**  
**Οδηγίες:**

**Απαιτείται επέμβαση στην πτώση των πετάλων, όταν στο 5% των ανθέων υπάρχουν ακμαία και νύμφες θριπών (ελέγχουμε δύο άνθη από 50 δένδρα).**

**Φυτ/κά**  
**προϊόντα:**

**Ροδακινιά- Νεκταρινιά:** Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Αμπαμεκτίν + Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν + Χλοραντράνιλιπρόλ, *Beauveria Bassiana strain atcc 74040*, Δελταμεθρίν, Λάμντα σιαλοθρίν, Μπέτα σουφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπιροτετραμάτ, Τα-Φλουβαλινέιτ, Φορμετανέιτ.

**Δαμασκηνιά:** Αμπαμεκτίν, Αμπαμεκτίν + Ακριναθρίν, *Beauveria Bassiana strain atcc 74040*, Δελταμεθρίν, Μπέτα σουφλουθρίν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**