

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)



Περονόσπορος. Προσβολή σε φύλλο.



Φθορμαία. Το έντομο εισέρχεται από τις ρωγμές του εδάφους.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Βαγγέλης Α. Αλατοατιανός

2.

Στις πρώιμες φυτεύσεις έχει αρχίσει η φυσιολογική γήρανση των φυτών και πλησιάζει η συγκομιδή.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (<i>Phytophthora infestans</i>)	- Η ασθένεια έχει εμφανιστεί στο οροπέδιο από τις αρχές Ιουλίου. - Στις συνθήκες του οροπεδίου σημειώνονται κατά διαστήματα έντονες νυχτερινές δροσιές που ευνοούν την εξάπλωση της.
Διαπιστώσεις:	- Όσο υπάρχουν πράσινοι προσβεβλημένοι ιστοί (φύλλα, βλαστοί) η ασθένεια μέσω των σπολίων μεταφέρεται στους κόνδυλους. - Υγιείς κόνδυλοι μπορεί να μολυνθούν και μόνο με επαφή με προσβεβλημένα τμήματα των φυτών.
Συστάσεις:	Να συνεχιστεί η προστασία των καλλιεργειών με διασυστηματικά ή διεσδοτικά σκευάσματα μέχρι την πλήρη ξήρανση των φυτών.
Σημείωση:	Οι κόνδυλοι και τα φυτικά υπολείμματα της καλλιέργειας που έχουν προσβληθεί από περονόσπορο και παραμένουν στο χωράφι αποτελούν το μέσο μεταφοράς της ασθένειας από τον ένα χρόνο στον άλλο.

<p>ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ: (<i>Phthorimaea operculella</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Συστάσεις:</p>	<p>- Οι σημαντικότερες ζημιές σημειώνονται κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση, ωστόσο, η μείωση των πληθυσμών της φθοριμαίας στο χωράφι, ιδιαίτερα λίγο πριν τη συγκομιδή, συμβάλλει σημαντικά στην μείωση των προσβολών.</p> <p>- Οι κόνδυλοι της πατάτας μπορούν να προσβληθούν στο χωράφι μέσω των ρωγμών του εδάφους από όπου το έντομο εισέρχεται.</p> <p>Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να γίνονται κανονικές αρδεύσεις για την αποφυγή ρωγμών του εδάφους. - Να γίνει ένας ψεκασμός στο στάδιο ωρίμανσης των κονδύλων, περίπου 10 - 15 μέρες πριν την έναρξη της συγκομιδής.
--	--

ΦΑΡΜΑΚΑ: Δεν επιτρέπεται η χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων στην καλλιέργεια της πατάτας. Διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φαρμάκων.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Να τηρείται αυστηρά ο χρόνος ασφαλείας από την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του φαρμάκου.

Ηράκλειο 7 Αυγούστου 2013
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης