



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**22 /19-5-17**

## ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

### **1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ**

**Διαπιστώσεις:** Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

**Οδηγίες:** **Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:**

**α) Πρώιμες περιοχές: Από 21 έως 24 Μάη**

**β) Όψιμες περιοχές: Από 24 ως 27 Μάη.**

Σε οπωρώνες που έγινε επέμβαση για τον Κόκκο ή την Παρλατόρια, να μην επέμβετε και για την ψώρα.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

*Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ* . Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

### **2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις είναι σε εξέλιξη. Οι εκκολαφθείσες προνύμφες κινούνται στη βλάστηση.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που την περσινή χρονιά υπήρχαν προσβολές, να γίνει **καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα** και οπωσδήποτε πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό. Ο ψεκασμός εναντίον αυτής της γενιάς είναι καθοριστικός για την καταπολέμηση του εντόμου. Οι επόμενες επεμβάσεις, απλά μειώνουν τους υπάρχοντες πληθυσμούς.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

*Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ* .

### **3.ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ**

**Διαπιστώσεις:** Οι προσβολές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών προνυμφών.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές και δεν υπάρχει το ωφέλιμο αρπακτικό, να γίνει **επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα**. Πριν αποφασίσετε για επέμβαση, καλό είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη του ωφέλιμου αρπακτικού. ►

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.

**4.ΘΡΙΠΕΣ**

Είναι είδη πολυφάγα με αρκετές γενιές μέσα στο έτος. Ενήλικα και ανήλικα άτομα νύσσουν και μυζούν τα επιφανειακά κύτταρα φύλλων, ανθέων και καρπών προκαλώντας νεκρωτικά στίγματα, εσχάρωσεις, δερματώσεις και κηλιδώσεις κυρίως πορτοκαλιών και λεμονιών . Οι εσχάρωσεις στους καρπούς μπορεί να έχουν μορφή δακτυλίου γύρω από το μίσχο ή ακανόνιστου σχήματος που καλύπτουν μικρό ή μεγάλο μέρος της επιφάνειάς τους μειώνοντας έτσι την εμπορική αξία.



**Οδηγίες:**

Σε οπωρώνες που υπήρχαν τέτοια συμπτώματα πέρυσι ελέγξτε άμεσα καρπίδια και στην περίπτωση που το 5-10% των καρπιδίων έχουν προσβολή να γίνει άμεσα επέμβαση.

**Φυτ/κά  
Προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός,.

**5.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Οδηγίες:**

Άμεση έναρξη επεμβάσεων με τη λήψη του δελτίου σε όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**1) Ψεκασμοί κάλυψης :**

Βιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana strain atcc 74040* , { Λάμντα σουλοθρίν , Μαλαθίον-7 ημέρες πριν την συγκομιδή}, { Δελταμεθρίν 30 ημέρες πριν την συγκομιδή.}

**2) Χρήση παγίδων:**

Άμεση ανάρτηση στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.

**6.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ- ΠΟΥΛΒΙΝΑΡΙΑ**

**Διαπιστώσεις**

Δεν έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη. Παρακολουθούμε με συχνές δειγματοληψίες την εξέλιξη των δύο εντόμων. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

**Οδηγίες:**

**7. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Διαπιστώσεις:**

Δεν έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα των δύο εντόμων. Θα

**Οδηγίες:**

ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

**8. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ** (*Aculops pelecassi*) – **ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ** (*Eriophyes sheldoni*)

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που διαπιστωμένα τα ακάρεα δημιουργούν έντονες προσβολές και δεν έγινε προανθικός ψεκασμός να γίνει επέμβαση.

**Φυτ/κά  
προϊόντα**

**Aculops pelecassi:** *Θερινά λάδια.*

**Eriophyes sheldoni:** *Αμπαμεκτίν, Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια.*

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- 1. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.**
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**