







ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Βιολογική καλιέργεια	ΩΙΔΙΟ	ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ	ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	ΜΟΝΙΛΙΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ=ΜΗΛΙΑ/ Α=ΑΧΛΑΔΙΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες ή βλαστικό στάδιο)
Aureobasidium pullulans				■		M/A	Εφαρμογές στην άνθηση
Aureobasidium pullulans		Σε μηλιά και αχλαδιά για μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών μέχρι και τη συγκομιδή (0 ημέρες)					
Bacillus subtilis ΒΑΚΙΛΛΟΣ			■	■		M/A	3
Bacillus amyloliquefaciens ΒΑΚΙΛΛΟΣ				■	■	M/A	0
Ziram			■			M/A	ΑΧΛΑΔΙΑ: 60 ΜΗΛΙΑ: Πτώση πετάλων
Sulphur ΘΕΙΟ		■	■			M/A	3 ή 7 (ανάλογα το σκεύασμα)
Thiophanate-methyl			■			M/A	3
Thiram			■		■	M/A	35
Captan			■			M/A	Έως στάδιο καρπιδίου
			■		■	M/A	21
			■			M/A	28
Kresoxim-methyl		■	■			M	28
			■			A	
Laminarin				■		A	-
			■	■		M	
Mancozeb			■			M/A	28
			■			M	45
Metiram			■			M/A	21
Myclobutanil		■	■			M	21
			■			A	
Myclobutanil		■				M/A	14
Cyprodinil + Fludioxonil			■		■	M/A	3
			■	■		M	7
		■			A		
Bupirimate		■				M	21
Dithianon			■			M/A	42
Dithianon + Pyraclostrobin		■	■			M	35
			■			A	
dithianon+pyrimethanil			■			M/A	56
dithianon+potassium phosph.			■			M/A	35
Difenoconazole			■			M/A	14
Dodine			■			M/A	60
Penconazol		■				M/A	14
Penthiopyrad		■	■			M/A	21

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Βιολογική καλλιέργεια	ΩΔΙΟ	ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ	ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	ΜΟΝΙΛΙΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ=ΜΗΛΙΑ/ Α=ΑΧΛΑΔΙΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες ή βλαστικό στάδιο)
Propineb			■			M	Έως λίγο μετά την άνθηση
Pyrimethanil			■			M	28
			■			M/A	56
Cyproconazole			■			M	90
Cyflufenamid		■				M	14
Cyprodinil			■			M/A	21 ή 60 (ανάλογα το σκεύασμα)
Cyprodinil + Tebuconazole			■			M/A	60
Triadimenol		■				M	21
Tebuconazole		■	■			M/A	14
			■			M	35
Trifloxystrobin		■	■			M/A	14
Trifloxystrobin + Captan		■	■			M/A	35
Trifloxystrobin + Tebuconazole		■	■			M	14
			■			A	
Trichoderma asperellum + gamsii		Σε μηλιά και αχλαδιά για σηψηρριζία με εφαρμογή στη γραμμή ή στο λάκκο φύτευσης πριν ή κατά την φύτευση					
Fluopyram + Tebuconazole		■	■			M/A	14
Fludioxanil	Σε μηλιά και αχλαδιά για μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών μέχρι και 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή						
Flutriafol		■	■			M/A	21
Fluxapyroxad		■	■			M/A	35
Fenbuconazole			■			M/A	28
Fluquinconazole + Pyrimethanil		■	■			M/A	56
Fosetyl - al				■		M/A	28
Bordeaux mixture ΧΑΛΚΟΣ (ΒΟΡΔΙΓΑΛΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)			■			M	(-)
Copper oxychloride ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ)			■	■	■	M/A	(-)
Tri-basic Copper sulfate ΧΑΛΚΟΣ (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ)			■		■	A	(-)
Copper hydroxide ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ)			■	■	■	M/A	(-)
Copper oxide ΧΑΛΚΟΣ (ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ)			■	■		M/A	(-)

(-) Μη εφαρμόσιμο. Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Η λίστα αφορά δραστικές ή μίγματα τους με έγκριση για ψεκασμούς φυλλώματος και εφαρμογή στο έδαφος. Δεν περιλαμβάνονται εγκρίσεις για εμβάπτιση καρπών ή υποκαπνισμό χώρων συντήρησης.

Επιπλέον, η λίστα είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Για τυχόν νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις και αποσύρσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων

μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.& Τ. στη διεύθυνση :

http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_CROPS_skeyasma.aspx

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα των φαρμάκων.